

17 x 25 cm

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS SOLUBLES (SG)

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoate 50 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

Reg. PQUA N° 1072 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

AGREVO PERUANA S.A.C.
www.agrevoperuana.com

Jr. San Sebastián N° 298.
Urb. El Sol de la Molina II Etapa,
La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (01) 6328482



Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., LTD

29 F, Soho Mansion, No 8 South Zhongshan Road, Nanjing
CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1 Kg

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

17 x 25 cm

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

• Peligroso si es inhalado, evite respirar el polvo o aspersión. • Puede causar irritación a los ojos. • No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. • Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. • Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. • Utilice ropa protectora (sombbrero, lentes protectores, mascarilla, overol, guantes y botas de hule) durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. • No contaminar aguas, alimentos o forrajes. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forrajes del área recién tratada. • Tóxico para peces. • Lave el equipo de aplicación y de protección después de cada jornada. • No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. • Tóxico para abejas. "Tóxico para abejas expuestas a la aspersión directa. No se debe aplicar en época de floración". Si se encuentran panales cercanos se recomienda cubrirlos durante la aplicación del producto. No aplicar los productos cuando las abejas estén forrajeando activamente en el campo. Las aplicaciones al fin de la tarde o en la noche son menos dañinas para las abejas. No aplique los productos cuando las plantas están en floración a menos que sea completamente necesario. Evitar la deriva del pesticida hacia colmenas o áreas donde hay cultivos o plantas salvajes floreciendo. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico: Avermectinas.

Insecticida de origen natural, derivado de la fermentación del microorganismo Streptomyces avermitilis.

• En caso de sospechar una intoxicación, detener el trabajo y llamar inmediatamente al médico. Mientras tanto, alejar al afectado de la zona de peligro y aplicar las medidas de primeros auxilios. • En caso de inhalación, llevar al afectado a un área bien ventilada. • En caso de contacto con la piel o ropa, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua limpia, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos y consultar al médico si se persisten las molestias. • En caso de ingestión, llamar de inmediato a un médico y llevar la etiqueta del producto. No inducir al vómito. Mantener al afectado abrigado en reposo. No administrar nada por vía oral a un paciente que este inconsciente y mantenerlo acostado de lado. **Antídoto:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 AGREVO PERUANA S.A.C.: 989-004643

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: • Peligroso para organismos acuáticos. • No contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos. • Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros. • No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación de sobrantes del producto. • Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada. • Evitar que el producto se aplique en zonas con napa freática superficial o en suelos altamente permeables. • En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. • Tóxico para abejas. • Peligroso para abejas y artrópodos benéficos.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: CROSS, insecticida, familia de productos avermectinas.

Larvicida, de origen natural, con poderosa actividad translaminar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros y otros como minadores foliares. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos. **CROSS**, se prepara disolviendo la dosis indicada en un recipiente con agua, se mezcla homogéneamente, y luego esta solución se agrega al cilindro o mochila (según sea el caso) y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre técnico	Kg/Ha	Kg/200L		
ESPÁRRAGO	Gusano ejército	Spodoptera eridanea	0.20	-	7	0.5
PIMIENTO	Gusano perforador grande de la bellota	Heliothis virescens	0.15	-	1	0.2
ARÁNDANO	Gusano perforador grande de la bellota	Chloridea virescens	-	0.08	7	0.01
TOMATE	Oruga minadora de hoja y tallo	Tuta absoluta	0.125	-	3	0.02
ESPÁRRAGO	Gusano perforador grande de la bellota	Chloridea virescens	0.2	-	88	0.002

LMR: Límite Máximo de Residuos (partes por millón - ppm)

P.C.: Periodo de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Espárrago y Pimiento: Realizar máximo 01 aplicación por campaña/año cuando se observe las primeras larvas en el cultivo.

Tomate y Arándano: Se recomienda una aplicación por campaña, considerando 2 campañas por año.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas, después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD: La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

