

SuperBacillus

6.4% WP

(*Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki*)

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki

≥ 32000 UI de Potencia por mg 6.4%

Aditivosc.s.p. 100%

INSECTICIDA BIOLÓGICO DE USO AGRICOLA

Reg. PBUA N° 312 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.



FORMULADO POR:

TRUSTCHEM CO., LTD
D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza,
89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

Importador y Distribuidor:
CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido
Neto: **1kg**

LIGERAMENTE TÓXICO
PRECAUCIÓN

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES, MANIPULEO, ALMACENAJE Y TRANSPORTE:

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Utilizar careta de protección durante la preparación de la solución.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrela la etiqueta. En el caso de contacto, enjuague los ojos o la piel con abundante agua.

NOTA AL MÉDICO

DL 50 Oral Aguda > 5000 mg/kg
DL 50 Dermal Aguda > 2000mg/kg
Teléfonos de emergencia:
CICOTOX 0800-1-3040

ANTÍDOTO

No tiene antídoto específico, todo tratamiento es sintomático.

INDICATIVOS DE USO

SUPERBACILUS 6.4% WP es un insecticida biológico a base de *Bacillus thuringiensis* var. *kurstaki* patógeno de acción letal para larvas de lepidópteros en diferentes cultivos.

SUPERBACILUS 6.4% WP actúa por ingestión después de ser ingerido por la larva del insecto, esto causa inapetencia y se detiene el daño al cultivo. Las larvas afectadas mueren en un lapso de 2 a 4 días.

SISTEMAS DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Disolver la dosis recomendada de SUPERBACILUS 6.4%WP en una cantidad reducida de agua. Luego completar el resto del volumen de agua manteniendo agitación constante del caldo de aplicación. Se recomienda previo a la preparación, acidificar el agua a un pH de 5 a 7. Aplicar con métodos convencionales de aspersión. Calibrar el equipo antes de iniciar la aplicación. Aplicar el producto inmediatamente después de realizada la mezcla con el agua. Por su modo de acción la aspersión debe ser distribuida uniformemente, tanto en el haz como el envés de las hojas. Iniciar las aplicaciones tan pronto aparezcan los primeros daños o las primeras larvas.

EPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar los primeros signos de infestación en los cultivos (larvas de 1° y 2° estadio). Puede hacerse una segunda aplicación a los 10-12 días después de la primera. Realizar hasta 3 aplicaciones por campaña.

COMPATIBILIDAD

SUPERBACILUS 6.4% WP no se debe mezclar con productos alcalinos (productos con contenido de calcio) ni con aguas duras o pH alcalino.

FITOTOXICIDAD

SUPERBACILUS 6.4% WP no es fitotóxico si se usa de acuerdo a las indicaciones e instrucciones dadas.

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

NOTA AL COMPRADOR

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	*PC (días)	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	g/200 L de agua		
Espárrago	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	250-300	--	--
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	250-300	--	--
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	250-300	--	--
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200-300	--	--

*PC: Periodo de carencia.

**LMR: Límite Máximo de Residuos

MANTÉNGASE ALEJADO DE LAS PERSONAS, ANIMALES, PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y MEDICINALES



DESTRUYA ESTE ENVASE INMEDIATAMENTE DESPUES DE USAR EL PRODUCTO

