

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO":
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Este producto es de cuidado, no ingerir.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Para todos los cultivos recomendados en la etiqueta utilice equipo de protección y guantes durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas después de la aplicación.
Para aplicaciones en el cultivo de vid, utilizar equipo de protección completo y guantes sobre una primera capa liviana de ropa (usar dos capas de protección).
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y bien cerrado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupos químicos: Anilino pirimidine (Pyrimethanil)
Pyridyl ethylamide (Fluopyram)
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o llevar al paciente al centro médico y mostrar la etiqueta.
Este producto no tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático.
En caso de ingestión: no inducir el vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral si la persona está inconsciente. Enjuagar la boca con abundante agua limpia.
En caso de contacto con la piel: retirar la ropa y zapatos contaminados, lavar la piel con abundante agua y jabón, mínimo 15 minutos.
En caso de inhalación: trasladar a la persona al aire libre. Mantenerla en reposo y abrirla. Brindar respiración artificial si fuera necesario.
En caso de contacto cutáneo: lávase inmediatamente con jabón y abundante agua, retire y elimine toda la ropa y zapatos contaminados.
En caso de contacto con los ojos: lavar los ojos levantando los párpados, con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Retirar lentes de contacto si los hubiera y continuar enjuagando.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847 SAMU: 106 Bayer S.A.: 01-2113800

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente para su gestión.
-Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
-Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
Respetar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
El aplicador debe tomar todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los lugares destinados por las autoridades locales para este fin.



Luna[®] Tranquility

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Composición:

Fluopyram, 125 g/L
Pyrimethanil, 375 g/L
Aditivos, c.s.p 1 litro

Reg. PQUA N° 1108-SENASA

Titular del Registro:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 - San Isidro.

Formulado por:

Bayer CropScience S.A
Carrera 50 Calle 8
Soleidad
Barranquilla
Colombia

Importado y distribuido por:

Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10 San Isidro
Lima - Perú

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**Contenido
Neto: 1 litro**

Lote N°

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

© = Marca Registrada del grupo Bayer

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Luna Tranquility es un fungicida foliar formado por dos ingredientes activos complementarios: Fluopyram y Pyrimethanil.
El ingrediente activo Fluopyram es un inhibidor del Succinato deshidrogenasa actuando a nivel de la cadena respiratoria del patógeno mientras que Pyrimethanil interviene en el metabolismo de los hongos inhibiendo la secreción de enzimas.

GRUPO FRAC Pyrimethanil: 9. GRUPO FRAC Fluopyram: 7
Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	AGENTE CAUSAL DE LA ENFERMEDAD		DOSIS			PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TÉCNICO	%	L/ha	ml/cil		
Papa	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.2	1	400	30	Pyrimethanil: 0.05 Fluopyram: 0.03
Mandarina	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.075	--	--	14	Pyrimethanil: 7.0 Fluopyram: 0.6
Fresa	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	--	0.75	300	7	Pyrimethanil: 5 Fluopyram: 2
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.1- 0.125%	--	--	28	Pyrimethanil: 4 Fluopyram: 1.5

PC = Período de carencia (días) LMR = Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Luna Tranquility se aplica previa evaluación de la enfermedad en el campo, de acuerdo al nivel de daño económico. Se debe aplicar en forma preventiva o con los primeros síntomas de la enfermedad.
Se recomienda 1 aplicación por campaña rotando con otros grupos químicos diferentes dentro de un programa de manejo integrado. No aplicar más de 500 g de i.a Fluopyram /ha/año por vía foliar.
En el cultivo de vid, se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña. Aplicar siempre y cuando el cultivo presente un estado de desarrollo desde inflorescencias claramente visibles hasta bayas del tamaño de un perdigon y los racimos comienzan a pender. No aplicar más allá de estos estadios.

PERIODO DE REINGRESO:

12 horas

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD:

Luna Tranquility posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados; sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad en los cultivos ya que cada variedad puede reaccionar de manera diferente.

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto."

