

14,8 ± 0,1

19,9 ± 0,1

14,8 ± 0,1

14,8 ± 0,1

# AMIPRID®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO SOLUBLE (SP)**

**Composición:**

Acetamiprid ..... 200 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 131-SENASA



Titular del Registro:  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**  
(10 sobres de 100g)

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
VAPCO MANUFACTURING CO. LTD.  
Amman, Shimesani, Shaker Bin Zaid Street.  
Jordania.

**NO INFLAMABLE**  
**NO CORROSIVO**  **NO EXPLOSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**DAÑINO**

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
SAMU: 106  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
POLVO SOLUBLE (SP)



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AMIPRID® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que presenta una actividad translaminar y sistémica, actuando por contacto e ingestión.  
AMIPRID® 20 SP es empleado a través de aplicaciones foliares.  
AMIPRID® 20 SP actúa como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.  
AMIPRID® 20 SP se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Amauromyza maculosa</i>	0.3	-	7	0.7
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1 - 0.2	-	1	2
ARÁNDANO	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juteikae</i>	0.1 - 0.2	-	1	2
	Cigarrilla del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes oryzicola</i>	0.1	0.1	14	0.01
ARROZ	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.2	0.3 - 0.6	7	0.02
CEBOLLA	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.1 - 0.2	0.5	7	0.8
ESPÁRRAGO	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.2	-	1	0.6
FRESA	Minador de la hoja de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	0.5	7	0.9
MANDARINA	Queresa del palto	<i>Fiorinia florinae</i>	0.1	-	N.D.	0.01
PALTO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.2	7	0.3
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.2	0.5	7	0.3
PIMIENTO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	1	0.5
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	1	0.5
	Chinche harinoso	<i>Pseudococcus viburni</i>	0.1	-	7	0.5
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.10 - 0.15	-	7	0.5

P.C.: Período de Carenacia N.D.: No determinado L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. En plantas de tomate, se recomienda la aplicación después de 3 meses de la siembra. Para los cultivos de alcachofa, arándano, arroz, cebolla, espárrago, fresa, mandarina, palto, pimiento, tomate y vid se recomienda realizar una aplicación al año por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al área tratada 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD:** AMIPRID® 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.



Medidas en cm.

ENVASE: Caja de cartón.



14,8 ± 0,1

19,9 ± 0,1

14,8 ± 0,1

14,8 ± 0,1

# AMIPRID®



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

Composición:

Acetamiprid ..... 200 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 131-SENASA



Titular del Registro:  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.  
Calle Arica 242 Miraflores.  
Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

Importado y Distribuido por:  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Contenido Neto: **1 kg**  
(10 sobres de 100g)

Formulado por:  
NOVA CROP PROTECTION CO., LTD.  
8 South Liyuan Road, Jiangning District,  
Nanjing, China.

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

NO INFLAMABLE  
NO CORROSIVO  
NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
SAMU: 106  
SILVESTRE PERÚ S.A.C.: (01) 617-3300



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
INSECTICIDA AGRÍCOLA  
POLVO SOLUBLE (SP)



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

AMIPRID® 20 SP es un insecticida de amplio espectro que presenta una actividad translinar y sistémica, actuando por contacto e ingestión.  
AMIPRID® 20 SP es empleado a través de aplicaciones foliares.  
AMIPRID® 20 SP actúa como un análogo de acetilcolina, transmisor químico natural de los impulsos nerviosos, produciendo una excitación nerviosa continua en el insecto que le provoca la muerte.  
AMIPRID® 20 SP se emplea mezclando con agua limpia a la dosis recomendada en el cuadro de usos. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila a palanca, atomizador a motor, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/200L	kg/ha		
ALCACHOFA	Mosca minadora	<i>Amauromyza maculosa</i>	0.3	-	7	0.7
	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1 - 0.2	-	1	2
ARÁNDANO	Mosca blanca	<i>Aleurodicus juleikae</i>	0.1 - 0.2	-	1	2
ARROZ	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes oryzicola</i>	0.1	0.1	14	0.01
CEBOLLA	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.2	0.3 - 0.6	7	0.02
ESPÁRRAGO	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.1 - 0.2	0.5	7	0.8
FRESA	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.1 - 0.2	-	1	0.6
MANDARINA	Minador de la hoja de los cítricos	<i>Phyllocnistis citrella</i>	0.1	0.5	7	0.9
PALTO	Queresa del palto	<i>Fiorinia florinae</i>	0.1	-	N.D.	0.01
PIMIENTO	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.2	7	0.3
	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.2	0.5	7	0.3
TOMATE	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>	0.1 - 0.2	0.2 - 0.4	1	0.5
	Chinche harinoso	<i>Pseudococcus viburni</i>	0.1	-	7	0.5
VID	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus ficus</i>	0.10 - 0.15	-	7	0.5

P.C.: Periodo de Carencia N.D.: No determinado L.M.R.: Limite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. En plantas de tomate, se recomienda la aplicación después de 3 meses de la siembra. Para los cultivos de alcachofa, arándano, arroz, cebolla, espárrago, fresa, mandarina, palto, pimiento, tomate y vid se recomiendan realizar una aplicación al año por campaña.

**PERÍODO DE REINGRESO:** Puede reingresar al área tratada 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección personal.

**COMPATIBILIDAD:** AMIPRID® 20 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, los de reacción alcalina y agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:** La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

