

Longitud Total 28.90 cm.

Longitud de Color 28.00 cm.

Longitud Literal 27.00 cm.

09 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es de cuidado, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar la aspersión.
- No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla, y para ingresar a la área tratada en las primeras 24 horas.
- Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, ni forrajes.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Triazina
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de ingestión: No dar líquido, no inducir el vómito. No darle nada por la boca a una persona inconsciente.
- En caso de contacto con los ojos: mantener los ojos abiertos y enjuagar con agua durante 15 a 20 minutos, con los párpados abiertos.
- En caso de contacto con la piel: sacar la ropa contaminada, enjuagar inmediatamente con abundante agua.
- En caso de inhalación: Retirar al paciente del lugar de exposición, monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.

Teléfono de emergencia:

ESSALUD: 0801.10200 (Gratuito) **AGRO KLINGE S.A.:** (01) 641-0000.

CICOTOX Telf.: 0 800-1-3040 (Gratuito)

ANTÍDOTO: No existe uno específico. El tratamiento es netamente sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

•Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

•Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada

AMETEC®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ametryna..... 500 g/L
Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 1078-SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:



AgroKlinge

a member of ADAMA

Agro Klinge S.A.

Av. El Derby N° 254, Int. 306. Santiago de Surco.
Lima - Perú. Telf: (01) 641-0000

Formulado por:

Ningbo Generic Chemical Co, Ltd

Room 10-6, Shidai Square, N°8, Lengjing Street,

Ningbo 315010, Zhejiang, P.R. China

Teléfono: +86 574 87301088/ 87302088

Contenido Neto: 1 L

Lote N°:
F. de Form.:
F. de Venc.:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: AMETEC® es un herbicida sistémico selectivo, que es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas. Recomendado para el control pre-emergente y post-emergente temprano de malezas gramíneas, anuales y de hoja ancha.

AMETEC® se aplica en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente en pulverizaciones dirigidas a la maleza, con equipos convencionales de aspersión terrestre, provistos de boquillas de abanico, en perfecto estado de funcionamiento y previamente calibrados.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar AMETEC® inmediatamente después de la siembra sobre el terreno húmedo.

POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar AMETEC® preferentemente después de un riego, cuando las malezas de hoja ancha tengan de 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta de 1 a 2 hojas verdaderas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS(*) L/ha	P.C. (días)	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MANDARINA	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>	2,5 - 4	160	0.01
	"Amor seco"	<i>Bidens pilosa</i>			
	"Rabo de zorro"	<i>Setaria verticillata</i>			
	"Pata de gallina"	<i>Eleusine indica</i>			
	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>			

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados.
L.M.R = Límite máximo de residuos P.C. = Período de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar AMETEC® (i.e. Ametryna) como máximo una aplicación por campaña, considerando una campaña al año en pre-emergencia o postemergencia temprana (no más de 4 hojas).

PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al campo tratado hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos de reacción alcalina ó ácidos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"



UI:160818 V1