

# Mirage® 100 GR

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**NEMATICIDA AGRÍCOLA**

**Granulado- GR**

**Composición:**

Cadusafos : 100 g/kg

Aditivos : c.s.p.1kg

Registro N° 1079 - SENASA



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Telf.: (01) 617-3300

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

**Importado y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Formulado por:**

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.

Nanjing 211100 CHINA.

Contenido Neto: **5 kg**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Sulfato de atropina, vía intravenosa ó intramuscular

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7700  
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.

- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**MIRAGE® 100 GR** es un nematicida compuesto por cadusafos que actúa por contacto e ingestión.

**MIRAGE® 100 GR** inhibe la síntesis de la enzima acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso en *Meloidogyne incognita*

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

**MIRAGE® 100 GR** debe aplicarse luego de evaluar la presencia de la plaga.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña en el cultivo de vid, considerando una campaña por año.

Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña en el cultivo de pimiento, considerando 1 campañas al año

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**MIRAGE® 100 GR** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con aguas con carbonato y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**MIRAGE® 100 GR** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS kg/ ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
VID	“Nemátodo del nudo de la raíz”	<i>Meloidogyne incognita</i>	25	70	0.01
PIMIENTO	“Nemátodo del nudo de la raíz”	<i>Meloidogyne incognita</i>	10-20	70	0.01

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

