



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

NEMATICIDA AGRÍCOLA

Granulado- GR

Composición:

Cadusafos : 100 g/kg

Aditivos : c.s.p.1kg

Registro N° 1079 - SENASA



Titular de Registro:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.

Telf.: (01) 617-3300

Correo electrónico: sec@silvestre.com.pe

Importado y Distribuido por:

SILVESTRE PERÚ S.A.C.

Formulado por:

NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.

8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.

Nanjing 211100 CHINA.

Contenido Neto: **25 kg**

F. de Form:

N° Lote:

F. de Venc:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es tóxico, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar (polvo o vapor).
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Usar equipo de protección durante la manipulación y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y/o hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Sulfato de atropina, vía intravenosa ó intramuscular.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847
SILVESTRE PERU SAC: (51-1) 6173300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y dépositelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y para la fauna benéfica. No aplicar en época de floración.
- No contaminar fuentes de agua con sobrantes del producto.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **MIRAGE® 100 GR** es un nematicida compuesto por cadusafos que actúa por contacto e ingestión. **MIRAGE® 100 GR** inhibe la síntesis de la enzima acetilcolinesterasa a nivel del sistema nervioso en *Meloidogyne incognita*

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- **MIRAGE® 100 GR** debe aplicarse luego de evaluar la presencia de la plaga. Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña en el cultivo de vid, considerando una campaña por año.

PERIODO DE REINGRESO

- Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD

- **MIRAGE® 100 GR** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, excepto con agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD

- **MIRAGE® 100 GR** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS kg/ ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|---------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| VID | “Nemátodo del nudo de la raíz” | <i>Meloidogyne incognita</i> | 25 | 70 | 0.01 |

PC: Período de Carenia

LMR: Límite Máximo de Residuos

