

1 cm

22.6 cm

0.5 cm

12 cm

1.8 cm

ENVASE: COEX  
Etiqueta 500 mL

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es LETAL POR INGESTIÓN, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Piretroides
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, enjuágalos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Antídoto: no existe antídoto específico.
- En caso de emergencia llamar a los siguientes teléfonos.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

CICOTOX: 08001-3040      BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido de los envases, inutilice triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- \* Altamente peligroso para abejas
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita  
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**Composición:**  
Alfacipermetrina ..... 100 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

**Reg PQUA N°**  
**Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC**

Importado y Distribuido por:  
**BIOAGROCORP TRADING SAC**

Lote N°: \_\_\_\_\_      Formulado por:  
Fecha de Form.: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD  
Fecha de Venc.: N° 23 Lane 5398, Shenzhuan Road,  
Songjiang District - Shanghai  
CHINA

**NO CORROSIVO**      **INFLAMABLE**      **NO EXPLOSIVO**

**Contenido Neto: 500 ml**

**MODERADAMENTE PELIGROSO**

**DAÑINO**

**NOMBRE COMERCIAL**

NEGRO      C:0 M:0 Y:0 K:100

**PICTOGRAMA**

Banda toxicológica      Pantone Yellow  
C:0 M:0 Y:100 K:0

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SUPERMATE 100 EC** es un insecticida de contacto e ingestión, usado para el control de "Mosca minadora" en papa y "Polilla" en tomate.

**SUPERMATE 100 EC** causa la alteración de los impulsos nerviosos llevando a la parálisis y muerte del insecto.

**SUPERMATE 100 EC** se prepara diluyendo la dosis recomendada en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen total.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO**

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha		
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	0.4	14	0.01
Tomate	"Polilla"	<i>Tuta absoluta</i>	0.25	0.5	7	0.2

P.C.: Período de carencia      L.M.R.: Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña cuando la plaga se encuentre con un 5% de infestación en el cultivo.  
No se debe aplicar SUPERMATE 100 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

**PERÍODO DE REINGRESO:** 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:** SUPERMATE 100 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

**FITOTOXICIDAD:** No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.