PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es LETAL POR INGESTIÓN, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
- Ningún envase que haya contenido plaquicidas debe utilizarla para conservar alimentos o aqua para consumo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- · No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante
- agua v jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- · Grupo Químico: Piretroides
- · En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta
- · En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos
- En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y limpiar la zona expuesta con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: no existe antídoto específico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040

BIOAGROCORP TRADING SAC 370-7251

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido de los envases, inutilícelo triturándolo o perforándolos y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- · Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- "Altamente peligroso para abejas"
- · No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- · Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- · Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estangues o arrovos con los desechos o envases vacíos.
- · No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el
- área tratada. · El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- · En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

_			. /
1.0	mn	neir	ınn:
CU	\mathbf{H}	JOIL	ión:

Aditivos c.s.p 1 L

Reg PQUA N° 1082 - SENASA Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC

Importado y Distribuido por:

BIOAGROCORP TRADING SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 402 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina -Lima Teléfono: 370-7251

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 500 ml Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

Formulado por: SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD N° 23 Lane 5398. Shenzhuan Road.

Song Jiang District - Shanghai

NO EXPLOSIVO

SUPERMATE 100 EC es un insecticida de contacto e ingestión, usado para el control de "Mosca minadora" en papa y "Polilla" en tomate.

SUPERMATE 100 EC causa la alteración de los impulsos nerviosos llevando a la parálisis y muerte del insecto.

SUPERMATE 100 EC se prepara diluyendo la dosis recomendada en un cilindro con la mitad de agua, agitar bien y completar con agua al volumen

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R
COLINOS	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/Ha	(días)	(ppm)
Рара	"Mosca minadora"	Liriomyza huidobrensis	0.2	0.4	14	0.01
Tomate	"Polilla"	Tuta absoluta	0.25	0.5	7	0.2
Pimiento	"Polilla (gusano del fruto)"	Symmestrichema capsicum	0.15	-	7	0.1

P.C.: Periodo de carencia (días) L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: Partes por millón)

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Se recomienda hasta 2 aplicaciones por campaña cuando la plaga se encuentre con un 5% de infestación en el cultivo.

No se debe aplicar SUPERMATE 100 EC en cultivos y plantas durante la floración, ya que es tóxico para abejas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: SUPERMATE 100 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.




















INFLAMABLE















NOMBRE COMERCIAL C:0 M:0 Y:0 K:100

PICTOGRAMA

Pantone Yellow

2

C:0 M:0 Y:100 K:0