

(22.8 x 12 cm)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Peligroso a las vías respiratorias, evite respirar la aspersión. Utilice equipo de protección respiratoria.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manejo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese la ropa y bañese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado y almacenarlo en lugares frescos y ventilados.
- No utilizar los envases vacíos para almacenar bebidas, alimentos, medicinas, agua ni forraje.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Anilino/pirimidina
- En caso de ingestión, llevar al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- No provoque el vómito si la persona está inconsciente.
- En caso de inhalación retirar al paciente a un lugar fresco y aplicar oxígeno o respiración artificial; llevar al paciente inmediatamente con agua y jabón durante 15 min.
- En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada.

Antídoto: No existe. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

SAMU: 106 KULTIVA SOLUTIONS S.A.C.: (044) 610509

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligrosos para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos y otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobantes, del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. “No permitir animales en el área tratada”.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
- Aplicar temprano en la mañana o en la tarde, para evitar la deriva por el viento.

PERSEV®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Pyrimethanil 400 g/L

Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 1088 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

KULTIVA SOLUTIONS S.A.C.

N3 Lote 1 - Dpto. 202,
Urb. San Andres V Etapa,
Victor Larco Herrera,
Trujillo, La Libertad, Perú
Teléfono: (044) 610509



Kultiva
tus mejores cosechas

Formulador:

FLAGCHEM INTERNATIONAL CO., Ltd.

29 F, Soho Mansion, N°8 South Zhongshan Road,
Nanjing. CHINA

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 500 ml

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

PERSEV es un fungicida de contacto con acción traslaminar, que pertenece al grupo de los Anilino/pirimidinas y que actúa inhibiendo la producción de enzimas del hongo, y con ello interrumpe su desarrollo.

Se aplica en aspersión previa mezcla en agua. Se recomienda llenar el cilindro hasta la mitad y agregar la dosis recomendada de **PERSEV**; agitar continuamente y completar el resto con agua. Aplicar en aspersión con un equipo en perfecto estado y debidamente calibrado.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	mL/Cil.	L/Ha		
Fresa	Botrytis	Botrytis cinerea	200	-	7	0.05
Mandarina	Botrytis	Botrytis cinerea	200	-	14	8
Palto	Botrytis	Botrytis cinerea	300	-	2	0.01
Vid	Botrytis	Botrytis cinerea	200	0.4	21	4
Pimiento	Podredumbre gris / Moho gris	Botrytis cinerea	200	-	1	2

P.C.: Periodo de carencia en días;

L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones favorezcan la aparición de la enfermedad.
- Se puede aplicar durante la etapa de floración y fructificación, respetando el periodo de carencia.
- Realizar como máximo 1 aplicación/campaña; considerando como máximo 2 campañas/año.
- Aplicar como máximo 0.4L/Ha.
- Realizar rotaciones con fungicidas de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

- Después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

FITOTOXICIDAD:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

