

21.5 cm

RAINBONIL PRO 80 WG

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos dispersables (WG)

Composición Química:

Fipronil..... 800 g/kg
Aditivos csp 1kg

Reg. PQUA N° - SENASA

Contenido Neto: 500g

Lote N°:
Fecha de Fabricación:
Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG
RAINBOW CHEMICAL CO., LTD.**

Binhai Economic
Development Area, Weifang,
Shandong 262737, China

Titular de registro, Importador
y Distribuidor:

RAINBOW AGROSCIENCES SAC

Av. El Polo N°670 Of- C-402.
Lima 33
Teléfono: 713-9960

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

36 cm

21.5 cm

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGA EL PRODUCTO BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos
- Este producto es dañino por Ingestión y por inhalación
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada después de las 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Mantener el producto alejado del fuego.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Phenylpyrazoles**
- En caso de ingestión no inducir al vómito. Llevar al afectado al médico inmediatamente y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua y jabón durante 15 minutos y lavar la ropa contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con agua corriente durante 15 minutos. Trasladar al paciente al médico especialista (oftalmólogo).
- En caso de inhalación: Trasladar al afectado a un ambiente fresco con buena ventilación. Llevar al médico.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito. Si el paciente esta inconsciente no dar nada por vía oral. Mantener la respiración.

En caso de EMERGENCIA llamar a:
CICOTOX: Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) o
ESSALUD EN LINEA: 117 (Opción 4)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido del producto, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Altamente peligroso para abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua como ríos, estanques o arroyos con los sobrantes del producto, envases vacíos o restos de aplicación.

- Respetar una banda de no aplicación hacia los cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RAINBONIL PRO 80 WG es un insecticida de amplio espectro, tóxico por el contacto e ingestión. Moderadamente sistémico que, en algunos cultivos, puede usarse en aplicación al suelo o semillas. Tiene una excelente acción residual luego de aplicaciones foliares.

Preparación y aplicación:

1. Mezclar la dosis recomendada con un poco de agua en un recipiente hasta lograr una suspensión uniforme. Luego, vaciar el contenido en la mochila, cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la cantidad total requerida.
2. La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestres.
- 3-La absorción de **RAINBONIL PRO 80 WG** puede ser mejorada con el uso de un coadyuvante apropiado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se aplica hasta dos veces por temporada o campaña/año.
Aplicar al inicio de detección de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

Se debe reingresar al campo tratado después de transcurridas 24 horas.

COMPATIBILIDAD

Incompatible con productos de reacción ácida o alcalina fuerte.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en el cultivo siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS g/cil 200L | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|---------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | Nombre común | Nombre científico | | | |
| Espárrago | "Mosquilla de los brotes" | <i>Prodiplosis longifila</i> | 80-120 | 21 | 0.1 |

P.C. = Periodo de carencia

LMR = Límite máximo de residuos

36 cm

