

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO**

El producto debe ser conservado en su envase original bajo condiciones de temperatura de 10 a 24°C en lugar seco bajo sombra.

No comer, beber, o fumar durante la manipulación. Utilizar ropa de protección durante la manipulación.

No transportar ni almacenar junto a alimentos o cualquier producto de uso humano.

Usar ropa de protección para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de utilizar en campo lavarse la mano y bañarse, cambiarse de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto del producto con la ojos y manos lavarse con abundante y jabón. en caso de ingestión, solicitar la asistencia medica

INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL 50 aguda dermal ratas 2.00g/kg de peso

DL 50 Oral aguda en ratas 2.00mg/kg

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante garantiza que el producto que contiene en este envase concuerda con la descripción del ingrediente activo, y se debe utilizar siguiendo las instrucciones de uso.

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

TEOSIM

FUNGICIDA BIOLOGICO AGRICOLA

Bacillus subtilis

CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente activo:

Bacillus subtilis.1x 10⁹ UFC/ml

Aditivos.....C.S.P 1 Litro

REGISTRO PBUA N°

Titular del Registro:

Gap del Perú S.R.L

Jr. Manuel Pardo N° 490 - Lima - Lima - Lima

Nextel: 145*5604 - 143*9830

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR : Gap del Perú SRL

Jr. Manuel Pardo N° 490 - Lima - Lima - Lima

Nextel: 145*5604 - 143*9830

CONTENIDO NETO: 01 Litro

LOTE :

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEOSIM Es un fungicida biológico preventivo para el control de las enfermedades que se indican en el cuadro abajo. TEOSIM es una formulación de bacterias altamente activas en concentrado líquido en un medio compuesto de ácidos orgánicos.

CULTIVO	Nombre común	Nombre científico	DOSIS
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	4-6 litros/ hectarea
Palto	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.5 - 1.0 litros/ cilindro
Arándano	Mancha parda	<i>Alternaria alternata</i>	
Esparrago	Mancha chocolate	<i>Cercospora asparagi</i>	
	Mancha púrpura	<i>Stemphylium versicarium</i>	

MOMENTO Y FORMA DE APLICACIÓN

Aplicar en cualquier etapa frenológica del cultivo, en forma preventiva, al observar condiciones favorables para el desarrollo del patógeno, y en forma curativa al observar los primeros síntomas de la enfermedad.

COMPATIBILIDAD.

Es compatible con todo los plaguicidas y fertilizantes foliares y bioestimulantes.

PERIODO DE CARENCIA: No tiene días de carencia

MECANISMO DE ACCIÓN Las bacterias al ser aplicado sobre la planta inician un proceso de liberación de entotoxinas, inhibiendo la germinación de espora y desarrollo del hongo.



MANTENGASE ALEJADO DE
LAS PERSONAS, ANIMALES,
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y
MEDICINAS.

**LIGERAMENTE TOXICO
PRECAUCIÓN**

DESTRUYA ESTE ENVASE
INMEDIATAMENTE DESPUES
DE USAR EL PRODUCTO

