

28 cm.

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTE ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evite el contacto con la piel, con los ojos y con la ropa.
- Usar obligatoriamente guantes, botas de jebe, overol, anteojos de protección y tapabocas o mascarillas, esto durante la aplicación del producto y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No fumar, ni comer, ni beber durante la manipulación y uso de este producto.
- Después de usar el producto, cambiese lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para el almacenamiento de alimentos o agua o bebidas.
- No almacenar, ni transportar junto con animales, bebidas, medicinas y/o forrajes.
- Conserva el producto dentro del envase original, etiquetado y cerrado.
- Guardar en un lugar seco, con buena ventilación y bajo sombra.
- Aplicar siguiendo la dirección de viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación inmediatamente llamar a un médico, mientras tanto alejar al afectado de la zona de peligro.
- En caso de contacto con los ojos lave con abundante agua manteniendo los párpados bien abiertos, durante 15 a 20 minutos. Si el contacto fuese directo con la piel retirar la ropa y lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación trasladar al afectado al aire libre y si es necesario aplicar respiración artificial.
- En caso de ingestión llame inmediatamente al médico, suministre un vaso de agua al paciente. NO inducir al vómito.

No tiene antídoto específico, su tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX Telef. 0800-1-3040 (atención las 24 horas)
ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000, OPCIÓN 4
FARM TECH PERU S.A.C. (01) 366-8741

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

Después de usar el contenido enjuagar el envase 3 veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para las abejas y antrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- El aplicador debe emplear las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Respetar una banda de 5 metros hacia fuentes de agua.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

MIDA 350 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

Composición:

Imidacloprid350gr./ Lt.
Aditivos.....c.s.p.1 Lt.

Registro PQUA N° 1098-SENASA

Titular, Importador y Distribuidor:

FARM TECH PERU S.A.C.

RUC 20600132084

Calle Orión Mza. C lote 24
Parque Industrial El Asesor, Ate, Lima, Lima

Formulado y Fabricado por:

KINYIELD INDUSTRY CO. LIMITED

Dirección: Unit 905, Workingberg Commercial Building 41-47,
Marble Road, Hong Kong, China.



Contenido Neto: 1 litro

*Nro. Lote:
Fecha de Producción:
Fecha de Vencimiento:*

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MIDAPRID 350 SC es un insecticida sistémico, translaminar para ser aplicado en el control de la *prodiplosis longifila* la "mosquilla de los brotes". Actúa por ingestión y contacto.

Preparación de mezcla: Vierta la cantidad de MIDAPRID 350 SC en un tanque de mezcla que contenga hasta la mitad, luego complete el volumen de agua y agite la mezcla hasta que sea homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

Cultivo	Plaga		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Kg./200L	Kg./Ha.		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.150 - 0.200		3	0.50

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Puede ser aplicado como máximo hasta 3 veces por campaña. Aplicar a los primeros ataques de la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar antes de 24 horas al campo tratado.

COMPATIBILIDAD

MIDAPRID 350 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Es incompatible con productos alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos si se emplea a la dosis indicada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

15 cm.

