17.1 cm

17.1 cm

23.5 cm

Agry-Gent Plus 800®

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

BACTERICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Sulfato de gentamicina.....20 g/Kg
Clorhidrato de oxitetraciclina.....60 g/Kg
Aditivos.....c.s.p. 1 Kg

PQUA N° 205 - SENASA

Titular del Registro:

Sumitomo Corporation del Peru S.A.
Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.
Telf.: (511) 242-7991

Formulado por:
QUIMICA AGRONÓMICA DE MÉXICO
Calle 18 N° 20501, Esquina con Innovación,
Parque Industrial Impulso C.P. 31109 Chihuahua, Chih., México.
Telefax (614) 483-9000

Importado y Distribuido por:
SUMMIT AGRO SOUTH AMERICA SPA, SUCURSAL PERU.
Av. José Pardo N° 513 Of. 701 Miraflores, Lima 18 Perú.
Telf.: (511) 242-7991

CONTENIDO NETO : 800 gr
Numero de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :

® Marca Registrada

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para reingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, fumar ni beber durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar junto con alimentos, forrajes, bebidas o medicinas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo humano.

PRIMEROS AUXILIOS
- Grupo Químico: Gentamicinas y Tetraciclinas.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación llevar a la persona a un lugar bien ventilado y consiga atención médica si se detecta tos u otro síntoma.
- En caso de ingestión inducir el vómito y conseguir atención médica. No inducir el vómito en una persona inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONO PARA EMERGENCIA TOXICOLÓGICA
CICOTOX 0800-13040 (Linea gratuita) O
ESSALUD 117 (Linea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.
Después de usar el contenido destruya éste envase y deposítelo en los lugares destinados por la autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, flora y fauna silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear toda las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y deposítelo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AGRY GENT PLUS 800® es un bactericida de uso agrícola que actúa inhibiendo la biosíntesis de proteínas en las bacterias fitopatógenas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
AGRY GENT PLUS 800® se aplica en pulverización manual, a motor o montada sobre el tractor. Para la preparación de la mezcla, llene el cilindro o tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad y luego agregue el producto revolviendo constantemente.
Complete luego hasta el volumen deseado.
Para la preparación, manipuleo y aplicación, utilice ropa protectora.

AGRY GENT PLUS 800® se recomienda máximo 2 aplicaciones por campaña/año con 14 días de intervalo entre ellas para obtener un control eficaz.

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 24 horas después de la aplicación. Mantener alejado al ganado durante este período.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con caldo bordales y cualquier otro producto de fuerte reacción alcalina o extremadamente ácida. Antes de realizar cualquier mezcla con otros plaguicidas se debe probar la compatibilidad entre los productos mezclándolos en su debida proporción en un envase pequeño.

FITOTOXICIDAD
No presenta síntomas de fitotoxicidad a las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL
"El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis (g/cil de 200 L)	P.C. dias	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
Alcachofa	"Pudrición bacteriana"	*Erwinia carotovora*	600 - 800	14	0.03
Arroz	"Añublo bacterial del arroz"	*Burkholderia glumae*	800	28	0.01

LMR: Limite Máximo de Residuos **PC:** Periodo de carencia

2.5 cm

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO