

0.7 cm

21.0 cm

0.5 cm

7.7 cm

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo y aspersión.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas o bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de la mezcla y aplicación del producto.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

CIPROSQUIM: 0800-5-0847      BIOAGROCORP TRADING SAC: 478-2002  
CICOTOX: 08001-3040      ESSALUD: 117

**Antídoto: Sulfato de atropina**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos beneficiosos, no aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.



# EXTREMO 400 EC

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

**Composición:**

Dimethoate ..... 400 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1 L

Reg. PQA N° 1101 - SENASA  
Titular del Registro: BIOAGROCORP TRADING SAC  
Importado y distribuido por:  
BIOAGROCORP TRADING SAC



Calle Los Flamencos N° 121 Interior 6 - Santa Anita  
Teléfono: 478-2002 / Fax: 362-0014

N° de Lote:  
F. de Form.:  
F. de Venc.:

Formulado por:  
NANJING RHONQUIM CO.,LTD  
Nro. 26 Majia Street, Nanjing Jiangsu  
210009 CHINA

NO CORROSIVO



INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



Contenido neto: 250 ml

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

EXTREMO 400 EC es un insecticida organofosforado que actúa por contacto e ingestión.

EXTREMO 400 EC actúa inhibiendo la enzima acetilcolinesterasa en la sinapsis nerviosa produciendo parálisis y muerte de los insectos.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USO:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	L/200 L	L/ha		
Mandarina	Queresá coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.25	1.25	21	0.02
Palto	Queresá	<i>Florinia florinae</i>	0.2	0.8	7	0.02

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:** EXTREMO 400 EC debe ser aplicado ante la presencia de la plaga. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. Aplicar un máximo de 2 aplicaciones por campaña.

**FITOTOXICIDAD:** EXTREMO 400 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



1.20 cm