

14.8 +/- 0.1 cm

14.8 +/- 0.1 cm

14.8 +/- 0.1 cm

14.8 +/- 0.1 cm

19.9 +/- 0.1 cm

19.9 +/- 0.1 cm

19.9 +/- 0.1 cm

19.9 +/- 0.1 cm

2.985 cm

2.985 cm

2.985 cm

2.985 cm

**CONTROLLER<sup>®</sup>**  
**PLUS 700 WG**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

GRÁNULO DISPERSABLE (WG)

**COMPOSICIÓN:**  
Imidacloprid..... 700 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p.1 kg

Reg. PQUA N° 1103 - SENASA  
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:  
NEOAGRUM S.A.C.

  
Pj. Camino de Acceso N° 02 - Urb. Parcelación Cajamarquilla  
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: **1 kg**      Formulado por:  
N° de Lote: SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED  
F. de Form.: 29 Xiaohang Road, Nanjing  
F. de Venc.: CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- **Grupo Químico: Neonicotinoide**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX: 328 7700  
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)  
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**  
CONTROLLER<sup>®</sup> PLUS 700 WG es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, trabaja interfiriendo la transmisión de estímulo en el sistema nervioso de los insectos, causando un bloqueo lo que da como resultado la parálisis y posterior muerte de los insectos.

**CONTROLLER<sup>®</sup> PLUS 700 WG** puede ser aplicado con toda clase de equipos pulverizadores terrestres de alto volumen. Utilizar boquillas de abanico plano. Mezclar la dosis recomendada de **CONTROLLER<sup>®</sup> PLUS 700 WG** con un poco de agua hasta formar una pasta cremosa, sin grumos. Adicionar más agua revolviendo continuamente y agregar a través de una malla o cedazo, este preparado al tanque de aplicación, el cual contiene el resto de agua. Durante la preparación de la mezcla y aspersión del producto mantener en marcha el sistema de aspiración.

| CULTIVO   | PLAGA                   |                              | DOSIS     |            | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------|------------------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común            | Nombre Científico            | kg / ha   | kg/200L    |                |                 |
| Cebolla   | Thrips                  | <i>Thrips tabaci</i>         | -         | 0.05 - 0.1 | 21             | 0.1             |
| Espárrago | Mosquilla de los brotes | <i>Proditopsis longifila</i> | 0.2       | -          | 30             | 0.05            |
| Mandarina | Quereza coma            | <i>Lepidosaphes beckii</i>   | 1         | -          | 30             | 1               |
| Palo      | Quereza                 | <i>Fiorinia florinae</i>     | 1         | -          | 7              | 1               |
| Pimiento  | Mosquilla de los brotes | <i>Proditopsis longifila</i> | 0.2       | -          | 7              | 1               |
| Vid       | Cochinilla harinosa     | <i>Planococcus ficus</i>     | 0.5 - 1.0 | 0.5 - 1.0  | 7              | 1               |

P.C.: Período de seguridad (días).      L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón).

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**  
N° máximo de aplicaciones por campaña: 1

**PERIODO DE REINGRESO:**  
Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este periodo, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD:**  
**CONTROLLER<sup>®</sup> PLUS 700 WG** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, oxidantes, alcalinos, fuertemente ácidos y abonos foliares, sin embargo, se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD:**  
**CONTROLLER<sup>®</sup> PLUS 700 WG** no es fitotóxico en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**  
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténganlo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.







|                |  |   |  |
|----------------|--|---|--|
| CAJA DE CARTÓN | LOGO NEOAGRUM  | LOGO PRODUCTO   | B.TOXICOLOGICA   |
|                |  PANT. 343 C  PANT. 377 C  PANT. 1375 C |  NEGRO |  PANT. YELLOW C |

CONFIDENCIAL: Prohibido reproducir sin autorización del CSGC del GRUPO SILVESTRE