

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- 1-Este producto es de cuidado, no ingerir.
- 2-Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo o aspersión.
- 3-Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.
- 4- Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado
- 5- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- 6-No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- 7-Utilice el equipo de protección durante el mezclado y aplicación y para ingresar a la área tratada en las primeras 12 horas.
- 8-Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- 9-Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- 10-Ningún envase que haya contenido plaguicida debe ser utilizado para conservar alimentos ni agua para consumo.

“Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”

PRIMEROS AUXILIOS:

- 1-Grupo químico: Triazol + Benzimidazol
- 2-En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve urgente al paciente a un centro médico más cercano, mostrándole la etiqueta o envase original.
- 3-Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.
- 4-En caso de ingestión no inducir al vómito sin supervisión médica. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente.
- 5-En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua con los párpados abiertos. Remover los lentes de contacto si pudiera hacerse con facilidad
- 6-En caso de contaminación de la piel, retirar toda la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- 7-En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladar a una zona ventilada, Si respira con dificultad, recurrir a un equipo de respiración artificial si fuera necesario.

**TELEFONOS DE EMERGENCIAS
CICOTOX: 0800-13040**

**Rotam Agrochemical Perú SA: 332-6633
Aló EsSalud 0801-10200 • CISPROQUIM: 0800 - 60847**

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del envase.
Devuelva el envase triple lavado al Centro de Acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- 1-Peligroso para organismos acuáticos.
- 2-No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos
- 3-No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- 4-Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- 5-Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- 6-El producto no debe aplicarse con en zonas con napas fráticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- 7-En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

TEBUZIM® 250 SC

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - (SC)

COMPOSICION:

TEBUCONAZOLE:.....125 g/L

CARBENDAZIM:.....125 g/L

Polipropilén glicol:50 g/L

Ingredientes aditivos:c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA No. 616-SENASA

Titular del registro

ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

No. de Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:



JIANGSU ROTAM CHEMISTRY CO., LTD.
No. 88 Rotam Rd, ETDZ, Kunshan,
Jiangsu 215301, PRC
TEL: 86512 - 5771 - 1988

Distribuido por:



ROTAM AGROCHEMICAL PERÚ S.A.
Av. Arenales 395 Of. 603
Lima 1 PERÚ
Teléfono: 332-6633,

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

TANDEM® 250 SC es un fungicida resultante de la mezcla de Tebuconazole y Carbendazim, ingredientes activos pertenecientes a los grupos químicos de los triazoles y benzimidazoles que inhiben la síntesis del ergosterol y la división celular en los hongos patógenos, presentando efecto curativo, erradicante y protectante, siendo sistémico en la planta una vez aplicado foliarmente

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO”

CUADRO DE USO Y DOSIS:

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C (litro)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/200L	L/Ha.		
Esparrago	“Cercosporiosis”	<i>Cercospora asparagi</i>	0,4-0,45	0,6-0,65	1	0,10* 0,05**

(*) Carbendazim

(**) Tebuconazole

P.C: PERIODO DE CARENANCIA Periodo transcurrido entre la última aplicación y la cosecha

LMR: LIMITE MAXIMO DE RESIDUOS:

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben de ser realizadas cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad y cuando las condiciones climáticas favorezcan su desarrollo
Aplicar **TEBUZIM® 250 SC** (Tebuconazole + Carbendazim) máximo una aplicación por campaña, considerando dos campañas al año.

PERIODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas, sin equipo de protección, durante 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

TEBUZIM® 250 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes fuertemente alcalinos


FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a los cultivos recomendados a la dosis indicada en la etiqueta

RESPONSABILIDAD CIVIL:

“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e indicaciones dadas.”

Fecha de aprobación:



**Ligeramente Peligroso
CUIDADO**

