

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

CRASHER® 5% SG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Solubles- SG

Composición

Emamectin benzoate 50 g/Kg
Aditivos c.s.p 1 Kg

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.
No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Este producto puede ser mortal si se ingiere.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas ni forraje.
Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: AVERMECTINA
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua por 15 minutos aproximadamente.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.
En caso de inhalación, colocar a la persona en un sitio con aire fresco y monitorear que no exista dificultad respiratoria. Si existe, practicar respiración artificial.
Antídoto: No existe antídoto específico.
En caso de emergencia llamar a:
CICOTOX: 0800-1-3040 / ESSALUD: 4237600

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
No aplicar en época de floración del cultivo.
No aplicar en presencia de polinizadores.
No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
Tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos cinco metros.
Peligroso para animales domésticos, fauna benéfica y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

CRASHER 5% SG, es un insecticida de acción translaminar, que actúa inhibiendo la neurotransmisión, produciendo paralización y detenimiento de su ingesta, recomendado su uso para el control de larvas de lepidópteros.
Hacer una premezcla hasta lograr una solución homogénea del producto y luego verter al tanque o cilindro.
La aplicación puede ser realizada con diversos equipos de aplicación terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Páprika	Perforador de órganos	<i>Heliothis virescens</i>	0.30	7	0.02
Palto	Gusano del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	0.20	5	0.01
Espárrago	Copitarsia corruda	<i>Copitarsia corruda</i>	0.15	30	0.01
Espárrago	Gusano de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.125 - 0.15		

P.C.: Período de carencia / L.M.R: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar CRASHER 5%SG (i.a. Emamectin Benzoato) hasta dos aplicaciones por campaña como máximo, considerando 07 días como intervalo de aplicación.

PERIODO DE REINGRESO

Ingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes excepto con los de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Instituto Peruano del Espárrago
y Hortalizas

Registro PQUA N° 1107 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: IPEH

FORMULADOR: SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD

6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750

Jinan, Shandong, China

+86-531-88875230

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR: IPEH

Calle 21 Nro 713 Of. 205, San Isidro PERÚ

Telefax: (511) 2255951- 2267332

www.ipeh.org.pe

® = Marca Registrada por IPEH

Fecha de Formulación:

N° Lote:

Contenido Neto: 25Kilos

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

