

28,00 cm

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
Evitar ingerir el producto.
Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y ojos.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

PRIMEROS AUXILIOS
Grupo Químico: Avermectinas
Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con abundante agua limpia durante varios minutos.
En caso de ingestión, si el paciente esta inconciente no dar nada por vía oral y no inducir al vómito.
Mantener la respiración.
En caso de inhalación colocar a la persona en un sitio con aire fresco.
En caso de emergencia llamar a:

ESSALUD: 08000 Anexo 4 **CICOTOX:** 0800-13040 **CISPROQUIM:** 0800-50847
Nota al médico: Barrier® 1.8% EC no tiene antídoto específico conocido, aplicar tratamiento sintomático.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase al centro de acopio autorizado.
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe usarse para conservar alimentos o agua para consumo.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
Es extremadamente tóxico para las abejas y para las especies acuáticas.
No aplicar en épocas de floración del cultivo.
No aplicar en presencia de polinizadores
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantenga a los animales fuera de las zonas tratadas.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Aplicar de preferencia por la mañana.

BARRIER® 1.8% EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable – EC

Composición:

Abamectin.....18 g/L
Aditivos c.s.p.....1 L

Registro PQUA N° 1120 - SENASA

Titular del registro:

INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO Y HORTALIZAS
Calle 21 N°713 Oficina 205 San Isidro Lima - Perú
Teléfono: (01) 225 5951

Formulado por:

JIANGSU HIGH HOPE CORPORATION
Dirección: 15 Hubu Street, Nanjing, Jiangsu, P.R. CHINA
Teléfono: 86-25-86895000

Importado y distribuido por:



Instituto Peruano del Espárrago
y Hortalizas

Contenido Neto: 1 L

N° Lote:
F. de Form:
F. de Venc:

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® Marca registrada

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Barrier® 1.8% EC es un insecticida de amplio espectro a base de Abamectin, con acción de contacto e ingestión, de actividad translaminar. Cuando la plaga ingiere **Barrier® 1.8% EC**, ataca el sistema nervioso del insecto, causando parálisis. La parálisis no se puede revertir.

PREPARACION Y APLICACIÓN

Barrier® 1.8% EC se emplea diluido en agua en las proporciones que se indican en el cuadro de uso. Llenar el tanque hasta la mitad con agua limpia y poner los agitadores en marcha, luego agregar la cantidad de **Barrier® 1.8% EC** recomendada y finalmente completar el llenado del tanque con agua. El equipo a utilizarse en la aplicación debe encontrarse en buen estado de funcionamiento. Debe mojarse bien las plantas a tratar considerando que su acción es por contacto e ingestión.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		PC	LMR
	Nombre común	Nombre científico	L/ha	mL/cil		
Alcachofa	Mosca lagunar	Nemormyza maculosa	-	225	7	0.01

PC: Período de carencia días / LMR: Límite máximo de residuos en ppm

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Barrier® 1.8% EC debe aplicarse tan pronto como se observen los estadios ninfales de la plaga a controlar, repetir la aplicación tan pronto se observe la reinfestación.
El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la plaga.
Número de aplicaciones: se realizará una (1) aplicación por campaña por hectárea para el cultivo. Se recomienda no hacer más de dos (2) aplicaciones seguidas con **Barrier® 1.8% EC** rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO: No reingrese a las áreas tratadas antes de las 12 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: **Barrier® 1.8% EC** puede ser mezclado con la mayoría de los plaguicidas de uso común. Sin embargo, en caso de duda se recomienda efectuar una prueba de compatibilidad física.

FITOTOXICIDAD: **Barrier® 1.8% EC** no presenta problemas de fitotoxicidad con el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



14,60 cm