

8 cm

12 cm

18 cm

EDICTO[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**FUNGICIDA AGRÍCOLA****SUSPOEMULSIÓN****COMPOSICIÓN:**

Azoxystrobin 69 g/L
Dodemorph acetato 333 g/L
Solvesso 150 150 g/L
Aditivos csp 1L

PQUA N° 1113 - SENASA

Titular de Registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Javier Prado Oeste 2442
Piso 16, Magdalena del Mar
Lima - Perú
Telf.: (511) 614-5100

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500 ml**
Fecha de Vencimiento :

Formulador:
INTEROC S.A.
Km 16.5 Vía Daule
(593) 42881662
Guayaquil - Ecuador

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE PERSONAS, ANIMALES PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y MEDICINAS
CONSERVESE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente. Lleve al paciente al médico y muéstrele copia de esta etiqueta y la hoja informativa adjunta.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

CICOTOX: 0800-1-3040 (Línea gratuita) - ESSALUD EN LINEA 411-8000 Opción 4
Para mayor información llamar a INTEROC S.A.: (511) 614-5100

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**CUADRO DE USOS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR* (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/cil	L/Ha		
Pimiento	"Oidium"	<i>Leveillula taurica</i>	0.4-0.5	0.8-1.0	28	0.01 ⁽¹⁾ 3.0 ⁽²⁾
Zapallo	"Oidiosis"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	0.4	0.8	1	1.0

LMR* Límite Máximo de Residuos (1) Dodemorph, (2) Azoxystrobin **PC:** Período de Carenia

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**