

Etiqueta TRASLATE x 1Kg 18 x 25.5 cm 18/06/15
Ampliación de uso PIMIENTO TIRA

(Medida de bolsa: 22 x 30.5cm)

TRASLATE

FUNGICIDA AGRICOLA

Polvo Mojable (WP)

Composición Química:

Fosetyl Aluminio: 800 g/kg

Aditivos..... csp 1kg

PQUA N° 1114 - SENASA

Titular del Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.

Av. Alfredo Mendiola 6068, Los Olivos - Lima, PERÚ

Teléfono: 6141500 Fax: 6141517

FARMAGRO S.A. 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

Formulado por:

Shanghai E-Tong Chemical Co., Ltd.

No. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road, Songjiang District

Shanghai, China.

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Etiqueta TRASLATE x 1Kg 18 x 25.5 cm 18/06/15
Ampliación de uso PIMIENTO RETIRA

(Medida de bolsa: 22 x 30.5cm)

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es dañino si se ingiere y causa irritación moderada a los ojos.
- No ingerir, ni entrar en contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Sal de ácido fosfórico
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En ingestión: No provoque el vómito, si está consciente dar de beber abundante agua.
- En contacto con los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos.
- En contacto con la piel: Quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: Retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS:

CICOTOX Telf.: 0 800-13040 (Atención 24 horas)
ESSALUD EN LINEA 0801-10200 (Gratuito)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

TRASLATE, es un fungicida sistémico del grupo de los fosfonatos que actúa bloqueando el crecimiento del micelio y la germinación de esporas. Este mecanismo de acción impide la penetración del hongo en la planta y su desarrollo.

TRASLATE, se aplica previo riego al campo de aplicación. Las aplicaciones se realizan con equipos de aspersión terrestre. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente para determinar el gasto de agua.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

Cultivo	ENFERMEDAD		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	kg/Clif	kg/ha		
Cebolla	"Mildiu"	<i>Peronospora destructor</i>	0.75	-	14	50
Pimiento	Podrición radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	-	1.5	3	130

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

- Realizar una riego antes de la aplicación.
- Realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año.
- La dosis máxima es de 3.0 kg/Ha.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: TRASLATE, no es compatible con agentes oxidantes. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico siempre y cuando se sigan las instrucciones de uso especificadas en la etiqueta y no se excedan las dosis de aplicación en el cultivo recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: “El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas”.

