

TEMPEST® 25% WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables – WG

Composición química

Thiamethoxam	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.
Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.
No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Causa irritación moderada a los ojos.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión, no dar líquido, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto y luego de 5 minutos

En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398

ESSALUD: 0-801-10200 (gratuito)

CIPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplique en época de floración.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplique temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

Peligroso para organismos acuáticos.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China
+86-531-88875230

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :

IPEH

Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro

Lima-Perú

Telefax: (511) 2255951– 2267332

NO CORROSIVO

TITULAR DE REGISTRO:

IPEH
Registro PQUA N° 1118- SENASA

NO INFLAMABLE

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEMPEST es un insecticida foliar sistémico que actúa por contacto e ingestión y por su diferente mecanismo de acción en comparación con los insecticidas convencionales, es eficaz contra poblaciones resistentes a organofosforados, carbamatos y piretroides. Es de largo efecto residual, posee una alta efectividad y es de baja toxicidad, además de ser selectivo al medio ambiente.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione TEMPEST 25% WG de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

Aplique el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual. Utilice boquillas cónicas para proporcionar una adecuada cobertura de las hojas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (Días)	LMR (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200 L		
Capicum	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.250		3	0.25
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodidiplosis longifolia		0.085 - 0.1000	7	0.05

P.C.: Periodo de carencia / L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña por año, cuando se observe la presencia de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

No presenta problemas de fitotoxicidad con el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Fecha de Formulación : x
Número de Lote : x
Contenido Neto : 25 Kilos
Fecha de vencimiento : x

® = Marca Registrada por IPEH

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



TEMPEST® 25% WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables – WG

Composición química

Thiamethoxam	250 g/Kg
Aditivos	c.s.p 1 Kg

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir.

Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto bajo techo, en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Causa irritación moderada a los ojos.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Neonicotinoide

En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

En caso de ingestión, no dar líquido, no inducir al vómito, no dar nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, mantener los ojos abiertos y enjuagar con abundante agua por 15 a 20 minutos. Sacar los lentes de contacto y luego de 5 minutos

En caso de inhalación, retirar al paciente del área contaminada y trasladarlo a una zona ventilada. Si la persona no respira, realizar respiración artificial.

Antídoto: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

En caso de emergencia llamar a:

CICOTOX: 0800-1-3040 (gratuito) / 328-7398

ESSALUD: 0-801-10200 (gratuito)

CIPROQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Toxico para abejas u artrópodos benéficos. No aplique en época de floración.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos diez metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.

No aplicar en presencia de polinizadores.

No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.

Aplique temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento. Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.

Peligroso para organismos acuáticos.

En caso de derrames, el producto debe ser recopilado inmediatamente y dispuesto en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación hacia aguas subterráneas.

FORMULADOR:

SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO., LTD
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750
Jinan, Shandong, China
+86-531-88875230

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR :

IPEH
Calle 21 Nro 713 Oficina 205 San Isidro
Lima-Perú
Telefax: (511) 2255951– 2267332

NO CORROSIVO

TITULAR DE REGISTRO:

IPEH
Registro PQUA N° 1118- SENASA

NO INFLAMABLE

MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

TEMPEST es un insecticida foliar sistémico que actúa por contacto e ingestión y por su diferente mecanismo de acción en comparación con los insecticidas convencionales, es eficaz contra poblaciones resistentes a organofosforados, carbamatos y piretroides. Es de largo efecto residual, posee una alta efectividad y es de baja toxicidad, además de ser selectivo al medio ambiente.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Calcule la cantidad de agua a emplear de acuerdo a la superficie a proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua, adicione TEMPEST 25% WG de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Agregue el resto de agua.

Aplique el producto mediante aspersión directa sobre el follaje de las plantas con una bomba de fumigar de mochila manual. Utilice boquillas cónicas para proporcionar una adecuada cobertura de las hojas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE DOSIS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (Días)	LMR (mg/Kg)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/200 L		
Capicum	Mosca blanca	Bemisia tabaci	0.250		3	0.25
Espárrago	Mosquilla de los brotes	Prodidiplosis longifolia		0.085 - 0.1000	7	0.05

P.C.: Periodo de carencia / L.M.R.: Límite máximo de residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda realizar como máximo una aplicación por campaña por año, cuando se observe la presencia de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


No se conoce incompatibilidad con otros plaguicidas.

FITOTOXICIDAD

No presenta problemas de fitotoxicidad con el cultivo y dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados si se usa y manejo de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Fecha de Formulación : x
Número de Lote : x
Contenido Neto : 5 Kilos
Fecha de vencimiento : x

® = Marca Registrada por IPEH

NO EXPLOSIVO



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

