



Confidor[®] 70WG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulo Dispersable en agua (WG)

Imidacloprid, 700 g/Kg
Aditivos, csp 1Kg

Reg. : PQUA N° 035-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San isidro.

Formulado por:
Bayer CropScience Ltd.
Central Avenue
Hiranandani Gardens
Powai, Mumbai - 400 076
India.

Importado y distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
San Isidro. Lima-Perú
Telf: 2113800

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE
NO EXPLOSIVO**

Contenido Neto:

Lote
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



® = Marca Registrada de Bayer AG / Alemania.

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilice ropa, máscara y guantes protectores durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar el contacto con la piel e inhalar al momento de la aplicación. Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
- No comer, no beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse la ropa y lavar la ropa contaminada.
- No aplicar en dirección contraria al viento.
- Uselo en sus envases originales y almacénelo herméticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado del alcance de los niños y animales domésticos.
- No se debe almacenar y ni transportar conjuntamente con productos alimenticios, bebidas, forrajes y medicinas.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Neonicotinoide

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la Etiqueta y la Hoja Informativa adjunta. Hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo. En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- Inducir el vómito sólo si el paciente está consciente. En caso de contacto con los ojos lavar con agua corriente por lo menos durante 15 minutos.
- Instrucciones de primeros auxilios: En casos de ingestión oral dar de beber mucha (No leche, ni alcohol, ni aceite) y una suspensión de 10 mg o más de carbón de uso medicinal en 150-200 ml de agua cada 4 a 6 horas hasta la mejoría del paciente. Dar de beber mucho líquido (varios litros en unas horas) para forzar la diuresis. Si se han contaminado los ojos lavar con agua corriente durante por lo menos 15 minutos.
- Indicaciones para el médico: Trátese sintomáticamente.
- Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico.

Teléfonos de emergencia en caso de intoxicación

CICOTOX: 0800-1-3040 CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques.
- No verter el resto del caldo de aspersión sobre vegetación útil y fuentes de agua (lagos, ríos, estanques, acequias).
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta, no reutilice los envases, destrúyalos.
- Peligroso para peces: No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para abejas. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- En caso de derrame recoger el producto con cuidado y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

USO ESPECIFICO:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg / ha	%		
Tomate	Mosca blanca	<i>Bemisia argentifolii</i>	0.375-0.5	--	7	0.5
Esparrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	--	n/d	n/d
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.25	0.05-0.06	14	1
Caña de azúcar **	Pulgón amarillo	<i>Sipha flava</i>	0.75	--	21	0.05

* PC = Periodo de carencia (días) ** LMR = Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

** En caso del cultivo de Caña de azúcar, aplicar en inyección al sistema de riego fraccionando el tiempo de riego en 3 partes: regar, inyectar el producto y regar al finalizar.

