

# MANTIS

## 50 SG

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos solubles (SG)**

### Composición Química:

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

**Registro PQUA N° - SENASA**



**Titular de Registro :** SILCROP S.A.C.  
Jr. Tampumachay 306  
Urb. Tambo de Monterrico. Surco. Lima - Perú.  
Tel.: (01) 714-9029

**Formulado por :** JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.  
7 Huanyang East Road Jixi County  
Anhui Province, China.

**Importado y  
Distribuido por :** SILCROP S.A.C.

**Contenido Neto: 100 g**

N° Lote  
F. de Form.  
F. de Venc.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es tóxico si se ingiere.  
Este producto causa irritación moderada a los ojos.  
Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.  
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas, forrajes ni semillas.  
Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.  
Utilizar ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.  
Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.  
Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Derivado de microorganismo  
En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero y limpie suavemente el exceso de material químico. Lave bien la piel con agua y un jabón no abrasivo.  
En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua tibia o solución salina por 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores, en caso de usar lentes de contacto removerlos.  
En caso de ingestión: lave la boca con agua. En caso de vómitos, administrar agua abundante para ayudar a diluir la sustancia, NO INDUCIR AL VÓMITO.  
Mantenga al paciente abrigado y en descanso. El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.  
Antídotos: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
CICOTOX 0-800-13-040  
ESSALUD: 0-801-10200  
SILCROP (01) 714-9029  
CISPROQUIM: 0-800-50-847

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.  
No aplicar en época de floración del cultivo.  
Peligroso para organismos acuáticos.  
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil 200 L		
ESPÁRRAGO	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.419	150	30	0.001

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carencia

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MANTIS 50 SG es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de larvas de *Heliothis virescens* en espárrago. Actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, las cuales dejan de alimentarse, se paralizan y luego mueren.

MANTIS 50 SG se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosificación indicada, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.  
MANTIS 50 SG puede ser aplicado con los equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar una aplicación por campaña, cuando se observen los primeros estadios larvales de la plaga en el cultivo.

### PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD

MANTIS 50 SG es compatible con otros plaguicidas de uso común.

### FITOTOXICIDAD

MANTIS 50 SG no es fitotóxico en el cultivo indicado en el cuadro de usos, debiendo usarse según las indicaciones de esta etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

