MANTIS

50 SG

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Gránulos solubles (SG)

Composición Química:

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg
Aditivos ..... c.s.p 1 kg

Registro PQUA Nº - SENASA

silcrop nutriprotección

Titular de Registro : **SILCROP S.A.C.**
Jr. Tampumachay 306
Urb. Tambo de Monterrico. Surco. Lima - Perú.
Tel.: (01) 714-9029

Formulado por : **JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**
7 Huanyang East Road Jixi County
Anhui Province, China.

Importado y Distribuido por : **SILCROP S.A.C.**

Contenido Neto: 200 g

Nº Lote
F. de Form.
F. de Venc.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
◊Este producto es tóxico si se ingiere.
◊Este producto causa irritación moderada a los ojos.
◊Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.
◊No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
◊No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas, forrajes ni semillas.
◊Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
◊Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
◊Utilizar ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.
◊Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.
◊Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
◊Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS
◊Grupo Químico: Derivado de microorganismo
◊En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero y limpie suavemente el exceso de material químico. Lave bien la piel con agua y un jabón no abrasivo.
◊En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua tibia o solución salina por 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores, en caso de usar lentes de contacto removerlos.
◊En caso de ingestión: lave la boca con agua. En caso de vómitos, administrar agua abundante para ayudar a diluir la sustancia, NO INDUCIR AL VÓMITO.
◊Mantenga al paciente abrigado y en descanso. El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
◊Antídotos: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800-13-040
ESSALUD: 0-801-10200
SILCROP (01) 714-9029
CISPROQUIM: 0-800-50-847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.
◊Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
◊Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.
◊No aplicar en época de floración del cultivo.
◊Peligroso para organismos acuáticos.
◊No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
◊No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
◊Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.
◊Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
◊El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
◊En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MANTIS 50 SG es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de larvas de *Heliothis virescens* en espárrago. Actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, las cuales dejan de alimentarse, se paralizan y luego mueren.

MANTIS 50 SG se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosificación indicada, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.
MANTIS 50 SG puede ser aplicado con los equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Se recomienda realizar una aplicación por campaña, cuando se observen los primeros estadios larvales de la plaga en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD
MANTIS 50 SG es compatible con otros plaguicidas de uso común.

FITOTOXICIDAD
MANTIS 50 SG no es fitotóxico en el cultivo indicado en el cuadro de usos, debiendo usarse según las indicaciones de esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil 200 L		
ESPÁRRAGO	Gusano perforador	*Heliothis virescens*	0.419	150	30	0.001

LMR: Límite Máximo de Residuos **PC**: Período de Carencia