

# MANTIS

## 50 SG

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Gránulos Solubles (SG)**

**Composición Química:**

Emamectin benzoato..... 50 g/kg

Aditivos ..... c.s.p. 1 kg

**Registro PQUA N° - SENASA**



**Titular de Registro:**

**SILCROP S.A.C.**  
 Jr. Tampumachay 306  
 Urb. Tambo de Monterrico. Surco. Lima - Perú.  
 Tel.: (01) 714-9029 / 714-9021 / 714-110

**Formulado por:**

**JIXI AGROSINO BIOTECH CO. LTD.**  
 7 Huanyang East Road Jixi County,  
 Anhui Province, China.

**Importado y distribuido por: SILCROP S.A.C.**

Contenido Neto: **1 kg**

N° Lote

F. de Form.

F. de Venc.

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
 “MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

Este producto es tóxico si se ingiere.  
 Este producto causa irritación moderada a los ojos.  
 Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.  
 No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.  
 No almacenar ni transportar junto a alimentos, bebidas, medicinas, forrajes ni semillas.  
 Conservar este producto en su envase original, etiquetado y cerrado.  
 Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.  
 Utilizar ropa protectora durante la manipulación, aplicación y para ingresar al área tratada dentro de las primeras 24 horas.  
 Almacenar el producto bajo techo, en ambientes frescos, secos y ventilados.  
 Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.  
 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo Químico: Derivado de microorganismo  
 En caso de contacto cutáneo: retirar la ropa contaminada, zapatos y artículos de cuero y limpie suavemente el exceso de material químico. Lave bien la piel con agua y un jabón no abrasivo.  
 En caso de contacto ocular: lavar bien los ojos con agua tibia o solución salina por 15 minutos, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores, en caso de usar lentes de contacto removerlos.  
 En caso de ingestión: lave la boca con agua. En caso de vómitos, administrar agua abundante para ayudar a diluir la sustancia, NO INDUCIR AL VÓMITO.  
 Mantenga al paciente abrigado y en descanso. El tratamiento deberá ser sintomático y de soporte. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.  
 Antídotos: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
 CICOTOX 0-800-13-040  
 ESSALUD: 0-801-10200  
 SILCROP (01) 714-9029  
 CISPROQUIM: 0-800-50-847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS.**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para abejas u artrópodos benéficos.  
 No aplicar en época de floración del cultivo.  
 Peligroso para organismos acuáticos.  
 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.  
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
 Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.  
 Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.  
 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.  
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g/cil 200 L		
ESPÁRRAGO	Gusano perforador	<i>Heliothis virescens</i>	0.419	150	30	0.001

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Período de Carenacia

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

MANTIS 50 SG es un insecticida de contacto e ingestión usado para el control de larvas de *Heliothis virescens* en espárrago. Actúa bloqueando las señales nerviosas de las larvas, las cuales dejan de alimentarse, se paralizan y luego mueren.

MANTIS 50 SG se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla en un balde de acuerdo a la dosificación indicada, luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua.  
 MANTIS 50 SG puede ser aplicado con los equipos convencionales terrestres con mochila a palanca, a motor, tecnomas, parihuelas, etc.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Se recomienda realizar una aplicación por campaña, cuando se observen los primeros estadios larvales de la plaga en el cultivo.

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

MANTIS 50 SG es compatible con otros plaguicidas de uso común.

**FITOTOXICIDAD**

MANTIS 50 SG no es fitotóxico en el cultivo indicado en el cuadro de usos, debiendo usarse según las indicaciones de esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponde a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

