

19.10.21

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito, tomar leche y hacer un tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, dar Calcio EDTA, Na2 EDTA ó Penicilamina.
- En caso de EMERGENCIAS llame a los siguientes teléfonos:

SAMU: 106
SERFI: 710-4068

- No dar de beber nada a un niño que se encuentra inconsciente.

Puccin®
77 WP

Puccin®
77 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Hidróxido de Cobre 770 g/kg
Aditivos csp 1 kg

Formulado y Distribuido por: Serfi S.A. - AG-SENASA

Título del Registro: SERFI S.A.

Lote N° :
Fecha Fab. :
Fecha Venc. :

CONTENIDO NETO:
1 kg

Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

CONDICIONES DE MANEJO DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puccin 77WP es un fungicida cúprico a base de Hidróxido de cobre, formulado como polvo mojable. Puccin 77WP contiene partículas de cobre muy pequeñas (1.8 micrones) lo que le confiere características únicas para este tipo de fungicidas como son excelente cobertura y mayor adherencia al follaje, obteniéndose por lo tanto un mejor control de enfermedades. Puccin 77WP es ideal para la mezcla de triazoles para el control de royas y otras manchas foliares.

Preparación y Aplicación: Puccin 77WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			g/L	kg/ha		
Ajo	Mildiu	<i>Puccinia sparganii</i>	2.5	1.0-2.0	7	5
	Alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	2.5	1.0-2.0	7	20
Apio	Cercosporiosis	<i>Cercospora apii</i>	2.5	1.0-2.0	7	20
	Mancha amarilla	<i>Hamulis vasistatis</i>	3.0-5.0	1.5-2.0	8	50
Cacao	Moniliasis	<i>Monilophthora roreri</i>	3.5	2.1	7	50
	Cercosporiosis	<i>Cercospora coffeicola</i>	4.0-5.0	1.5-2.0	8	50
Café (*)	Arañero	<i>Phyllosticta kosteroga</i>	5.0	1.5-2.0	8	50
	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	4.0-5.0	1.5-2.0	8	50
Mandarina	Mancha grisenta	<i>Mycosphaerella citri</i>	1.25	2.0-2.25	2	20
	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	2.5	1.0-2.0	ND	100
Palto	Cladosporium	<i>Cladosporium helianthi</i>	2.5	1.8 - 2.0	7	20
Papa	Hielo o Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5	1.5-3.0	7	5
Quinua	Mildiu	<i>Puccinia furcata</i>	3.8	1.7-1.8	14	10
Vid	Mildiu	<i>Plasmopara viticola</i>	2.5	2.0	7	50

PC.: Período de Carenza L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) NA: No Aplica

(*) En el caso de Café para control de Roya se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/ha

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa). En el caso de cacao, se recomienda aplicar en la etapa fenológica de fructificación.

PERÍODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

Puccin 77WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
C0 M30 Y95 K0 K100