

Puccin[®]
77 WP

Puccin[®]
77 WP

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:
Hidróxido de Cobre..... 770 g/kg
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. N° 507-97-AG-SENASA

Titular del Registro: SERFI S.A.

Formulado y Distribuido por:

Serfi
Av. República de Panamá 2577
La Victoria, Lima-Perú
Teléfono 51 (1) 710-4068

Lote N° :
Fecha Fab. :
Fecha Venc.:

CONTENIDO NETO:
1 kg

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

28.10.22

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE
USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Sales de cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito, tomar leche y hacer un tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, dar Calcio EDTA, Na₂ EDTA ó Penicilamine.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:

**SAMU: 106
SERFI: 710-4068**

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE
DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y
ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inutilice la bolsa cortándola. Entréguela o depositela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

RESPONSABILIDAD CIVIL

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puccin 77WP es un fungicida cúprico a base de Hidróxido de cobre, formulado como polvo mojable. Puccin 77 WP contiene partículas de cobre muy pequeñas (1.8 micrones) lo que le confiere características únicas para este tipo de fungicidas protectores como son excelente cobertura y mayor adherencia al follaje, obteniéndose por lo tanto un mejor control de enfermedades. Puccin 77WP es ideal para la mezcla de triazoles para el control de royas y otras manchas foliares.

Preparación y Aplicación: Puccin 77WP se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
			g/L	kg/ha		
Ajo	Moho	<i>Phoma sp.</i>	2.5	1.0-2.0	7	5
Ajo	Alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	2.5	1.0-2.0	7	20
		<i>Cercospora sp.</i>	2.5	1.0-2.0	7	20
Cacao	Moniliasis	<i>Monilophthora rotrei</i>	3.5	2.1	7	50
		<i>Phoma sp.</i>	3.0-5.0	1.5-2.0	8	50
Café (*)	Cercosporiosis	<i>Cercospora coffeicola</i>	4.0-5.0	1.5-2.0	8	50
		<i>Phyllosticta icteroga</i>	5.0	1.5-2.0	8	50
		<i>Mycera utriculata</i>	4.0-5.0	1.5-2.0	8	50
Mandarina	Mancha grisenta	<i>Mycosphaella citri</i>	1.25	2.0-2.25	2	20
Marigold	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	2.5	1.0-2.0	ND	100
Patito	Cladosporium	<i>Cladosporium helianthi</i>	2.5	1.8 - 2.0	7	20
Papa	Hielo o Ranchea	<i>Phytophthora infestans</i>	2.5	1.5-3.0	7	5
Piña	Podredumbre garrulosa	<i>Phytophthora caroliniana</i>	2.5	2.0	1	20
Quinua	Mildió	<i>Phoma sp.</i>	3.8	1.7-1.8	14	10
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	2.5	2.0	7	50

PC: Período de Carenza L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) NA: No Aplica

(*) En el caso de Café para control de Royas se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/año

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa). En el caso de cacao, se recomienda aplicar en la etapa fenológica de fructificación.

PERÍODO DE REINGRESO

24 horas.

COMPATIBILIDAD

Puccin 77WP es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

FITOTOXICIDAD

La aplicación de Dosis superiores a la señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos*.



MV PRODUCCIONES GRAFICAS



Serfi

C100 M0 Y0 K0 C78 M2 Y98 K9
C0 M30 Y95 K0 K100