

Puccin 77 WP®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición

Hidróxido de cobre.....77%
Ingredientes inertes 23%

Reg. N° 507-97-AG-SENASA

Titular del Registro: **Serfi S.A.**

Formulado e Importado por:

Serfi SA

Av. Oscar R. Benavides
(Ex Diagonal) 380 Of 701
Miraflores, LIMA – PERÚ
Teléfono 446-2896

N° de Lote :

Fecha de Fabric.:

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 Kg

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

**“LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Compuesto de cobre
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muestre la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca, y si el contacto fue por la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito, tomar leche y hacer un tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, dar Calcium EDTA, Na₂ EDTA o Penicillamine.
- En caso de **emergencia** llamar a los siguientes teléfonos:
CICOTOX 0-800-1-3040
Serfi S.A. 446-2896
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido de este envase enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Puccin 77 WP es un fungicida- cúprico a base de Hidróxido de cobre, formulado como polvo mojable. **Puccin 77 WP** contiene partículas de cobre muy pequeñas (1.8 micrones) lo que le confiere características únicas para este tipo de fungicidas de protección como son: excelente cobertura y mayor adherencia al follaje, obteniéndose por lo tanto un mejor control de las enfermedades.

Puccin 77 WP es ideal para la mezcla de triazoles para el control de royas y otras manchas foliares.

Puccin 77 WP se usa en pulverización con los equipos de uso común en buen estado de conservación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Usos y Dosis

| CULTIVO | ENFERMEDAD | PATÓGENO | g/L | Kg/Ha | PC (días) | LMR (ppm) |
|----------|-------------------------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| Ajo | Mildiú | <i>Peronospora destructor</i> | 2.5 | 1.0-2.0 | ND | 5 |
| Apio | ALternariosis, Cercosporiosis | <i>Alternaria sp.</i> <i>Cercospora apii.</i> | 2.5 | 1.0-2.0 | ND | 20 |
| *Café | Roya | <i>Hemileia vastatrix</i> | 3-5 | 1.5-2.0 | ND | 50 |
| Papa | Hielo o Rancho | <i>Phytophthora infestans</i> | 2.5 | 1.5-3.0 | ND | 5 |
| Marigold | Mancha de la hoja | <i>Alternaria sp.</i> | 2.5 | 1.0-2.0 | ND | 100 |
| Quinua | Mildiú | <i>Peronospora farinosa</i> | 3.8 | 1.7 | ND | 0.02(**) |

PC: Periodo de Carencia LMR: Límite Máximo de Residuos ND: No Determinado

(*) En el caso de Café para control de roya se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/año.

(**) El valor es considerado para la Unión Europea, en EEUU no se ha determinado (ND) en el producto tolerancias de residuos según EPA.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Como medida en general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando haya indicios de la presencia de la enfermedad y el cultivo esté en plena etapa de desarrollo.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD: **Puccin 77 WP** es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional.

FITOTOXICIDAD: No se han observado síntomas de fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

