



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada las primeras 24 horas.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Este producto es tóxico si se ingiere.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico: Sales de cobre.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental provoque vómito, tomar leche y hacer un tratamiento sintomático. En caso de intoxicación severa, dar Calcio EDTA, Na2 EDTA ó Penicillamine.
- En caso de **EMERGENCIAS** llame a los siguientes teléfonos:

**CETOX:** Tel. 273-2318; 0800 7191 |  
**ESSALUD:** 411-8000 (opción 4)

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.



**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**Composición:**  
Hidróxido de Cobre..... 770 g/kg  
Aditivos..... csp 1 kg

Reg. N° 507-97-AG-SENASA

Titular del Registro: **SERFI S.A.**

Formulador y Distribuidor:



Av. Oscar R. Benavides (ex Diagonal)  
380 Of. 701 Miraflores  
LIMA - PERU

Lote N° :

Fecha Fab. :

Fecha Venc. :

**CONTENIDO NETO:**  
**1 kg**

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No contamine ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

- El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**  
**"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**Puccin 77WP** es un fungicida cúprico a base de Hidróxido de cobre, formulado como polvo mojable. **Puccin 77 WP** contiene partículas de cobre muy pequeñas (1.8 micrones) lo que le confiere características únicas para este tipo de fungicidas protectantes como son: excelente cobertura y mayor adherencia al follaje, obteniéndose por lo tanto un mejor control de enfermedades.

**Puccin 77WP** es ideal para la mezcla de triazoles para el control de royas y otras manchas foliares. **Preparación y Aplicación:** **Puccin 77WP** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a aplicar con mochila manual o a motor.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

Cultivo	Enfermedad	Agente causal	Dosis		PC <sup>(1)</sup> (días)	LMR <sup>(1)</sup> (ppm)
			g/L	kg/ha		
Ajo	Mildió	<i>Peronospora destructor</i>	2,5	1,0 - 2,0	7	5
	Arañero	<i>Alternaria sp.</i>	2,5	1,0 - 2,0	7	20
Café (*)	Cercosporiosis	<i>Cercospora apii</i>	2,5	1,0 - 2,0	7	20
	Roya amarilla	<i>Hemileia vastatrix</i>	3,0-5,0	1,5 - 2,0	8	50
	Cercosporiosis	<i>Cercospora coffeicola</i>	4,0-5,0	1,5 - 2,0	8	50
	Arañero	<i>Pellicularia koleroga</i>	5,0	1,5 - 2,0	8	50
Marigold	Ojo de gallo	<i>Mycena citricolor</i>	4,0-5,0	1,5 - 2,0	8	50
	Mancha de la hoja	<i>Alternaria sp.</i>	2,5	1,0 - 2,0	ND	100
Papa	Hielo o Ranchar	<i>Phytophthora infestans</i>	2,5	1,5 - 3,0	7	5
Quinoa	Mildió	<i>Peronospora farinosa</i>	3,8	1,7 - 1,8	14	10
Vid	Mildió	<i>Plasmopara viticola</i>	2,5	2,0	7	50

PC.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón) N.D.: No Determinado  
(\*) En el caso de Café para control de Roya se recomiendan 2 aplicaciones por campaña/año  
1) Los valores son para la Comunidad Europea, en EEUU el producto está exento de residuos según EPA.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Como medida general recomendamos iniciar las aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando las condiciones ambientales favorezcan el desarrollo de la enfermedad (alta humedad relativa).

**PERIODO DE REINGRESO**

24 horas.

**COMPATIBILIDAD**

**Puccin 77WP** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso convencional, evitar productos muy ácidos o alcalinos. Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad antes de realizar la mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

No se han observado síntomas de fitotoxicidad

