VALORO®

250 SC

REGULADOR DE CRECIMIENTO AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:
Ingrediente activo:
Paclobutrazol.....250 g/L
Aditivos .....c.s.p 1 L

Reg. PQUA N° - SENASA

Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Fabricado y formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.
Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Teléfono: (86-510) 8785 1001
Fax: 8785 1537

Importado y distribuido por:
POINT ANDINA S.A.
Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Contenido Neto: **5 L**
N° de Lote:
Fecha de Formulación
Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Este producto es tóxico por ingestión. Causa irritación moderada a los ojos y a la piel.
- Use protección ocular durante la mezcla y aplicación y evite contacto con piel o boca.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas después de la aplicación.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa usada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en sus envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Químico: Triazol.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si esta consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.
- En caso de contacto, quítese la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

Teléfonos de Emergencia:
CICOTOX: 0800-13040
CISPROQUIM: 0800-50847 / ESSALUD: 117, 411-800
POINT ANDINA S.A.: (01) 3481018, (01) 3499609

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

ECONOMÍA SEGURIDAD TRIPLE LAVADO AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos; así como plantas acuáticas, subacuáticas y plantas terrestres no objetivo.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- No aplicar en zonas con napas fréaticas superficiales y/o subterráneas o en suelos altamente permeables.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en un lugar seguro a fin de evitar su lixiviación.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
VALORO 250 SC es un regulador del crecimiento del grupo de los triazoles, que inhibe la síntesis de giberalinas (hormona responsable del crecimiento vegetativo) disminuye el crecimiento vegetativo y propicia el desarrollo de yemas florales. Favorece de forma indirecta el desarrollo de los frutos cuajados de palta.

VALORO 250 SC se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua de pH 5 a 7. Aplicar en plantas en capacidad de campo. No aplicar en plantas estresadas o enfermas.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
- Realizar 1 aplicación por campaña. Considerando una campaña/año.
- Como máximo aplicar 6.0 L/ha.
- Las aplicaciones deben ser bien dirigidas a fin de evitar afectar a plantas no objetivo.
- No aplicar en plantas enfermas, ni con estrés por falta de humedad.

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al área tratada, 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Debido a la naturaleza de la aplicación no se recomienda mezclar **VALORO 250 SC** con ningún otro tipo de producto.

FITOTOXICIDAD
VALORO 250 SC no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	APLICACIÓN	DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
		%	L/ha		
Palto	Aplicar en la época de floración, cuando se tenga entre el 60-80% de floración. En pulverizaciones de gotas finas en forma de lluvia o rocío, dirigido a los brotes.	0.8 - 1.0	6.0	180	0.5

L.M.R.: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).
P.C.: Período de Carencia en días.

MARCA VALORO 250 SC PANTONE 483 C
LOGO POINT ANDINA S.A. PANTONE 356 C
TRIANGULO DEL TRIPLE LAVADO. TRIANGULO PANTONE 555 C
GOTA PANTONE 693 C
BANDA TOXICOLÓGICA PANTONE 293 C