

PANTONE 2945 C

FUNGICIDA AGRÍCOLA
GRÁNULO DISPERSABLE - WG

Azoxystrobin	500 g/kg
Aditivos	500 g/kg

Formulado por:
SHANDONG A&FINE
AGROCHEMICALS CO., LTD.
Shandong Shouguang Economy
Technology Development Zone,
Teléfono: 0086 536 5100106

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Javier Prado Este N° 6210,
Oficina 401, La Molina, Lima - Perú
Teléfono: (511) 419-3000
E-mail: info@corpmontana.com

Fecha de Exp.:

NO CORROSIVO NO INFLAMMABLE NO ESPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

[illegible]

JAMESOS AUXILIAR
Grupo Sumitomo-Extraduina
En caso de intoxicación tomar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua y si el dolor persiste acudir al médico.
En caso de contacto con la piel: lavar la persona a un lugar con agua y jabón.
En caso de ingestión: no provocar el vomito.
En caso de ingestión, solicitar atención médica inmediata. Si la persona puede beber: darle un litro o dos vasos de agua. No dar de beber nada a la persona que no pueda beber.
En caso de inhalación: trasladar a un lugar fresco y fresco. Si no se mejora, acudir al médico.

09061-08-0 X0103D
CICOTON: 0-302-1-3040

NAME IN A DISCREET MANNER THE DISCLOSURE OF THE

ningún orotipo que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Permiso para organismos acuáticos.
No contaminar aguas, ríos, estuarios o arroyos con los desechos y otros residuos.
No contaminar las fuentes de agua con restos de aplicación o sobrantes de producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuencas de aguas de al menos

Sinestros
animales para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir
animales en el área tratada.
No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en
suelos altamente permeables.
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio
designado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
AZOSTAR-SWG es un medicamento de amplio espectro para el control de los procesos infecciosos causados por bacterias gram positivas, gram negativas y fermentativas. Presenta una acción específica en forma de acción bactericida y movimiento translocatorio. Está indicado en todas las infecciones bacterianas de origen comunitario y hospitalario. Se recomienda su uso en la profilaxis de la infección de la herida quirúrgica, en el tratamiento de las infecciones de la piel y de las infecciones de las vías respiratorias. **AZOSTAR-SWG** inhibe la síntesis de las espigas, el crecimiento celular y la germinación de las esporas. **AZOSTAR-SWG** es un medicamento de acción antibacteriana. **AZOSTAR-SWG** favorece una mejor ventilación de los pulmones en la pleuritis, aumentando la capacidad funcional y reduciendo la sensibilidad a la infección. Este fármaco está en el 1.º nivel de tratamiento de la infección de la

Preparación de la Mezcla:
AZOSTAR 50 WG se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o 3/4 partes de su capacidad con agua y agregar a esta la dosis recomendada de **AZOSTAR 50 WG**. El líquido o suspensión que se forma debe ser aplicado inmediatamente, dentro del tiempo de aplicación y completo el tratamiento. El agua utilizada para la mezcla debe ser limpia y libre de contaminantes, viruta, aceites, etc. Es necesario diluir que el tanque cuente con un buen sistema de agitación.

AZOSTAR® 50 BRS puede ser aplicado con pulverizaciones manuales de poliduro (rodillo), motonebulizadores, equipos estacionarios o accionados por tractor. Los pulverizadores deben estar en buen estado y ser calibrados antes de ser utilizados.

MODIFICAR EN TODA LA VIDA LAS FRECUENCIAS Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Adaptar un fondo presentativo al entorno las condiciones son favorables para el desarrollo del negocio.

• **ACOSTIAR** 50W con cámara. Para el cliente, **ACOSTIAR** 50W es dos veces de manera, con el que para luego rotar con otro 50W de 50W de diferentes maneras.

PERÍODO DE REINGRESO
 Retregrese al área de trabajo después de 24 horas de agitado el producto.

COMPATIBILIDAD: AZOSTAR® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común e incompatible con los plaguicidas de fosforo organofosforal. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desea mezclar.

FITOTOXICIDAD: 50 WG no es fitotóxico usada a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de registro garantiza que las características físicas del producto contenido en este anexo corresponden a las anunciadas en la publicidad y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las instrucciones e instrucciones dadas.

THE CONSTITUTIONAL COMMITTEE

CULTIVOS	ENFERMEDAD		DOSIS	PC (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pringosa, papaya y ají	Odontia	<i>Leovathia laurica</i>	0.20 - 0.24	3	2
Wál	Odontia	<i>Erythraea rosea</i>	0.2	14	2
Cebolla	Monocha purpurea	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.25 - 0.30	100	10
Aletrioño	Odontia	<i>Leovathia laurica</i>	0.20 - 0.24	80	5
Alcapurro	Mancha purpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.20 - 0.25	80 o 100	0.05
Maniámpio	Mancha gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.40 - 0.50	40 - 50	0
Maniámpio	Mancha gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.40 - 0.50	40 - 50	0

1997. *Quercifolia* var. *W. J. Mill.* *Terre Marins de Bassin*