

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir ni respirar el polvo o la aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo techo, fresco seco y ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

#### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Estrobilurina + Triazoles

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

#### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 08001-3040 (gratuito) / 328-7398

Infosalud 0800-10828 (emergencia 24 horas)

ESSALUD EN LINEA: 411-8000 CISPROMQUIM: 0800-50847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Aplicar temprano en las mañanas o en las tardes. Evitar la deriva.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



# Amistrobin PLUS

## FUNGICIDA AGRICOLA

### SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

#### Composición Química:

Azoxystrobin..... 200 g/L  
Difenoconazole..... 125 g/L  
Aditivos ..... c.s.p 1L

#### Reg. PQUA N° XXX – SENASA

#### Titular del Registro:

Sociedad Anónima Fausto Piaggio

#### Formulado por:

Union Agrochem Crop Protection  
Technology Co., Ltd

N°2 Limbao Road, Tinglin Industrial Park, Jin Shan  
Shanghai - CHINA

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

SOC. AN. **Fausto Piaggio**

Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú

Tel.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211

E-mail: ventas@piaggio.com.pe

RUC: 20100244471



Contenido Neto: 5 L

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**AMISTROBIN PLUS** es un fungicida sistémico y de contacto que contiene azoxystrobin y difenoconazole, por lo que actúa afectando el metabolismo energético e inhibiendo la síntesis del ergosterol de la pared celular del hongo, lo que conlleva finalmente la muerte del hongo.

**AMISTROBIN PLUS** se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

#### CUADRO DE USOS Y DOSIS

| CULTIVO | PLAGA        |                         | DOSIS<br>L/ha | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm)                      |
|---------|--------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------|
|         | Nombre Común | Nombre Científico       |               |                |                                      |
| Vid     | "Oidiosis"   | <i>Erysiphe necator</i> | 0.45 - 0.5    | 14             | 2.0 <sup>1</sup><br>0.1 <sup>2</sup> |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos: <sup>1</sup> Azoxystrobin, <sup>2</sup> Difeconazole

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

- Aplicar previa evaluación y cuando se detecten los primeros síntomas de la enfermedad.
- Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña/año. Considerando 1 campaña al año.
- De ser necesaria una segunda aplicación, realizarla con un intervalo de 15 a 20 días.
- Usar la dosis más alta a mayor presión de la enfermedad.
- La dosis máxima es de 0.5 L/Ha.
- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

#### COMPATIBILIDAD:

**AMISTROBIN PLUS** es compatible con los agroquímicos y adyuvantes más comúnmente usados.

#### FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase concuerdan con la descripción indicada en la etiqueta, y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

