

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

Kryptón

50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA Nº 1138 - SENASA

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Formulado por:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION

West Tower, Fortune International Building

Nº 359 Hongwu Road, Nanjing

CHINA

Importado y Distribuido por: FARMEX S.A.



Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400.
www.farmex.com.pe

CONTENIDO NETO: 100 g

Lote Nº:

F. Form.:

F. Venc.:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

12.28 cm

2.28 cm

14.00 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos beneficios.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
ARROZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	30	0.01
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	200	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	200	7	0.02

P.C.: Período de carencia en días.

L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **KRYPTON 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas.
- **KRYPTON 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida.
- **KRYPTON 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Iniciar la aplicación de **KRYPTON 50 WG** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.
- Aplicar **KRYPTON 50 WG** hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones para los cultivos de espárrago y pimiento. En el caso del cultivo de arroz solo dos aplicaciones por campaña con 14 días de intervalo.

PERÍODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

KRYPTON 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

