




0.50 cm

21.000 centímetros

0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

# Krypton

## 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

### COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato ..... 50 g/kg  
Aditivos ..... c.s.p. .... 1 kg

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico:** Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA:** FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROMIM: 080-050-847.

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**KRYPTON 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **KRYPTON 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicia.

**KRYPTON 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| CULTIVO   | PLAGA                        |                              | DOSIS<br>(g/ha) | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|------------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
|           | NOMBRE COMÚN                 | NOMBRE CIENTÍFICO            |                 |                |                 |
| ARROZ     | Gusano cogollero             | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 100             | 30             | 0.01            |
| ESPÁRRAGO | Gusano cogollero             | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 200             | 30             | 0.01            |
| PIMIENTO  | Gusano perforador de bellota | <i>Heliothis virescens</i>   | 200             | 7              | 0.02            |

P.C.: Período de carencia en días. L.M.R.: Límite máximo de residuos en partes por millón.

### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar la aplicación de **KRYPTON 50 WG** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.

Aplicar **KRYPTON 50 WG** hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones para los cultivos de espárrago y pimiento. En el caso del cultivo de arroz solo dos aplicaciones por campaña con 14 días de intervalo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD.** **KRYPTON 50 WG** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes.

**FITOTOXICIDAD.** El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: FARMEX S.A.

Importado y distribuido por:



Calle Dean Valdivia N° 148 Piso 7  
San Isidro, Lima 27 - PERU  
Teléfono: (01) 630-6400  
www.farmex.com.pe

Reg. PQUA N° 1138 - SENASA

Formulado por:  
**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
West Tower, Fortune International Building  
N° 359 Hongwu Road, Nanjing  
CHINA

Lote N° :

F. Form.:

F. Venc.:

CONTENIDO NETO: 25 kg

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**



0.50 cm

4.50 centímetros

30.00 centímetros

0.50 centímetros

0.50 cm