0.50 cm

21.000 centímetros

0.50 cm

ZONA DE TROQUELADO

0.50 centímetros

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

# Krypton
## 50 WG

## PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

## INSECTICIDA AGRÍCOLA

## GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

**COMPOSICIÓN:**
Emamectin benzoato ..... 50 g/kg
Aditivos .....c.s.p..... 1kg

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**
- Este producto es de CUIDADO, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evite respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice el equipo de protección durante las operaciones de mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara contra el polvo, respirador u otros) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**
- **Grupo químico:** Avermectina.
- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- Nota al médico: No tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos.
- **TELÉFONOS DE EMERGENCIA: FARMEX S.A.: (01) 630-6400, CISPROQUIM: 080-050-847.**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**
- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**
**KRYPTON 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para el control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas. **KRYPTON 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida.
**KRYPTON 50 WG** se prepara haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en 1/3 del volumen de agua, se agita bien y luego se completa con agua hasta obtener el volumen deseado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS (g/ha) | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|---|---|---|---|---|---|
| | NOMBRE COMÚN | NOMBRE CIENTÍFICO | | | |
| ARROZ | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 100 | 30 | 0.01 |
| ESPÁRRAGO | Gusano cogollero | *Spodoptera frugiperda* | 200 | 30 | 0.01 |
| PIMIENTO | Gusano perforador de bellota | *Heliothis virescens* | 200 | 7 | 0.02 |

**P.C.:** Período de carencia en días. **L.M.R.:** Limite máximo de residuos en partes por millón.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**
Iniciar la aplicación de **KRYPTON 50 WG** cuando se tenga un 5% de infestación de la plaga en las plantas del campo.
Aplicar **KRYPTON 50 WG** hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones para los cultivos de espárrago y pimiento. En el caso del cultivo de arroz solo dos aplicaciones por campaña con 14 días de intervalo.

**PERÍODO DE REINGRESO.** Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD. KRYPTON 50 WG** es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes.
**FITOTOXICIDAD.** El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**
El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendado, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Titular del Registro: **FARMEX S.A.**

**Reg. PQUA Nº 1138 - SENASA**

**CONTENIDO NETO: 25 kg**

**Importado y distribuido por:**

Farmex

Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - PERU
Teléfono: (01) 630-6400
www.farmex.com.pe

Formulado por:
**SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO., LTD**
N° 23, Lane 5398, Shenzhuan Road
Song Jiang District, Shanghai
CHINA

Lote Nº :
F. Form.:
F. Venc.:

**NO CORROSIVO** **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

30.00 centímetros

4.50 centímetros

**LIGERAMENTE PELIGROSO**
**CUIDADO**

0.50 cm

0.50 cm