

**"LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Este producto es letal por ingestión, no ingerir.
- Peligroso si es inhalado, evitar respirar polvo o aspersión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito en la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- Nota al médico: El producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CICOTOX : 0800-1-3040 CROP BUSINESS SAC : 349 2669
 ESSALUD: 117 (gratuito) CIPROSQUIM: 0800-5-0847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de utilizar el contenido destruya el envase y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o acequias con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, aves, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

- **FINESSE 50 WG** es un insecticida de la familia de las avermectinas con actividad traslaminar utilizado para control de larvas de lepidópteros y otros minadores de hojas.
- **FINESSE 50 WG** actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvicida.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar FINESSE 50 WG (i.a. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurrido 24 horas del tratamiento.

FITOTOXICIDAD

El producto no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Kg/Ha	Kg/200L		
ESPÁRRAGO	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	-	30	0.01
PIMIENTO	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	-	7	0.02
MAÍZ	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.15	-	7	0.01
TOMATE	Oruga minadora de hoja y tallo	<i>Tuta absoluta</i>	0.15	-	7	0.02
ARÁNDANO	Gusano perforador de bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.09	7	0.01

P.C.: Periodo de Carenacia (días)

LMR: Limite Máximo de Residuos (ppm: Partes por millón)



FINESSE 50 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato 50 g/kg
 Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 1139 - SENASA

Titular del Registro: CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Av. Melgarejo N° 580 Dpto. 301 Urb. Santa Patricia I Etapa - La Molina

Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: 100 grs.

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

SHANGHAI E-TONG CHEMICAL CO.,LTD

Nro. 23, Lane 5398, Shenzhuan Road

Song Jiang District, Shanghai

CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**