

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- ## PRIMEROS AUXILIOS

- TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- ## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Tóxico para abejas y artrópodos benéficos.
- No aplicar en época de floración del cultivo.
- No aplicar en presencia de polinizadores.
- No aplicar si se verifica la presencia de abejas en el cultivo a tratar o cultivos aledaños.
- Aplicar temprano en las mañanas o muy en las tardes. Evitar la deriva por el viento.
- Notificar a los apicultores cercanos días antes de aplicar el producto, para el confinamiento de las abejas.
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanque o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico			
Espárrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	30	0.01
Pimiento	Gusano perforador de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	0.2	7	0.02

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FINESSE 50 WG actúa principalmente por ingestión y contacto directo, además tiene acción ovo-larvícida.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **FINESSE 50 WG** (i.a. Emamectin benzoato) hasta tres aplicaciones por campaña como máximo con un intervalo de 7 días entre aplicaciones, considerando 2 campañas por año para los cultivos de espárrago y pimiento.

PERIODO DE REINGRESO

PERIODO DE REINGRESO
Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

COMPATIBILIDAD

FINESSE 50 WG es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. No mezclar con aquellos de reacción alcalina, ácida u oxidante fuerte. Para mayor seguridad realizar pruebas previas de compatibilidad antes de su uso.

FITOTOXICIDAD

FINESSE 50 WG no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones aquí dadas.



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

GRANULO DISPERSABLE - WG

COMPOSICIÓN:

Emamectin benzoato	50 g/kg
Aditivos	c.s.p. 1kg

Reg PQUA N° 1139 - SENASA
Titular del Registro:CROP BUSINESS SAC

Importado y Distribuido por:

CROP BUSINESS SAC



Calle Toledo N° 161 Dpto 201
Urbanizacion Mayorazgo IV Etapa - ATE-LIMA
Teléfono: 349-2669

Fecha de Formulación:

Nº de Lote:

Contenido Neto: 25 Kgs

Fecha de Vencimiento:

Formulado por:

NORCHEM JIANGSU CORPORATION
West Tower, Fortune International Building
N° 359 Hongwu Road, Nanjing
CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO