



PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Polvo Mojable - WP**

**Composición:**

Emamectin benzoato : 50g/kg  
Lambda cyhalothrin : 100g/kg  
Aditivos : c.s.p.1kg

**Registro PQUA N° 1067 -SENASA**



**Titular de Registro:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**  
Calle Arica 242 Miraflores. Lima 18 - Perú.  
Tel.: (01) 617-3300

**Importado y Distribuido por:**

**SILVESTRE PERÚ S.A.C.**

**Contenido Neto: 1 kg**

**Formulado por:**

**NOVA CROP PROTECTION CO. LTD.**  
8 South Liyuan Road, Jiangning Dis.  
Nanjing 211100 CHINA.

F. de Form:  
N° Lote:  
F. de Venc:

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:**

Emamectin-benzoate: Avermectin  
Lambda-cyhalothrin: Piretroide

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**  
**CICOTOX: 328 7700**  
**ESSALUD: 411 8000 (opción 4)**  
**CISPROQUIM: 0800-50847**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**  
**Polvo Mojable - WP**

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

• **MAZON® 150 WP** es un insecticida compuesto por dos ingredientes activos, emamectin benzoate (insecticida no sistémico, de contacto e ingestión con efecto translaminar) y Lambda-cyhalothrin (insecticida de contacto e ingestión, con acción residual y repelente).

• **MAZON® 150 WP** se emplea mezclando con agua limpia las dosis recomendadas en el cuadro de usos. Aplicar en pulverización al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

**Cuadro de usos: "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	g/200L	g/ha		
ALCACHOFA	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	100-200	-	14	0.1 (a), 0.02 (b)
ESPÁRRAGO	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100	-	30	0.01 (a), 0.01 (b)
FRIJOL	"Langosta migratoria"	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	100-200	-	7	0.1 (a), 0.1 (b)
MAÍZ	"Langosta migratoria"	<i>Schistocerca piceifrons peruviana</i>	100-200	-	30	0.01 (a), 0.05 (b)
	"Gusano cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	100-200	-	21	0.01 (a), 0.05 (b)
PALTO	"Falso medidor"	<i>Oxydia vesulia</i>	100-200	-	5	0.01 (a), 0.02 (b)
PIMIENTO	"Caballada"	<i>Spodoptera eridania</i>	100	-	7	0.02 (a), 0.05 (b)
TOMATE	"Minador de hoja y tallo"	<i>Tuta absoluta</i>	100-200	-	7	0.02 (a), 0.1 (b)
ARROZ	"Novia del arroz"	<i>Rupela albiniella</i>	100-200	-	21	0.01 (a), 1.0 (b)

PC: Período de Carencia (días).

LMR: Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón).  
(a) Emamectin benzoate (b) Lambda-cyhalothrin

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar como máximo 1 aplicación de **MAZON® 150 WP** (i.e. Emamectin benzoate + Lambda-cyhalothrin) por campaña, considerando 2 campañas al año. Iniciar la aplicación al observar los primeros indicios de plaga en el cultivo. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico.

Para el cultivo arroz se recomienda realizar 1 aplicación por campaña, en dos campañas al año

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar al campo 48 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

**COMPATIBILIDAD**

**MAZON® 150 WP** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas, productos fuertemente alcalinos, ácidos y agentes oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

**FITOTOXICIDAD**

**MAZON® 150 WP** no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se sigue las recomendaciones dadas en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL  
ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

