

LEA LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
**ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación a las vías respiratorias, evitar respirar la aspersión en la mezcla y aplicación.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Tóxico y nocivo por ingestión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- **Grupo químico:** Piretroide.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (atención 24 horas)**  
**CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800-1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828**

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

ADAMA

Lamdex®  
 5 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

**COMPOSICIÓN :**

Lambdacyhalothrin ..... 50 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p.1 Litro

Reg. PQUA N° 280-SENASA


Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.  
 Miraflores. Lima - Perú.  
 Teléfono: 641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Makhteshim Ltd.**  
 P.O. Box 60.  
 Beer Sheva 8410001. Israel

CONTENIDO NETO: **500 ml**

Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:



NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

Lamdex 5 EC es un insecticida no sistémico a base de lambdacyhalotrin que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad ovicida y adulticida, y se caracteriza por su poder residual y propiedades repelentes.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	Mosca minadora del arroz ( <i>Hydrellia wirthi</i> )	0.25	21	1.0
Cebolla	Trips ( <i>Thrips tabaci</i> )	0.125 - 0.15	14	0.2
Espárrago	Trips ( <i>Thrips tabaci</i> )	0.125	7	0.02
Maiz	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	0.15 - 0.20	21	6.0 <sup>1</sup> /0.05 <sup>2</sup>
Papa	Gorgojo de los Andes ( <i>Premnotrypes suturicallus</i> )	0.25	0	0.01
Vid	Trips ( <i>Thrips tabaci</i> )	0.15 - 0.20	7	0.2

PC.: Período de Carencia  
 LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)  
 1-forraje /2-grano.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Número máximo de aplicaciones por campaña: Dos (2). Una (1) campaña al año  
 Intervalo mínimo entre aplicaciones: 15 días en papa, 10 días en espárrago y 7 días resto de cultivos.

**Momento de aplicación:**  
 Ver Hoja informativa adjunta

**PERIODO DE REINGRESO**

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura, con excepción de aquellos que presentan reacción alcalina. Si bien Lamdex 5 EC tiene buena flexibilidad para mezclas en tanque con otros agroquímicos, se recomienda realizar una prueba preliminar de compatibilidad con mezclas no probadas anteriormente.

**FITOTOXICIDAD**

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Dimensiones 230 mm x 120 mm

Nota: Esta etiqueta va acompañada de hoja informativa adjunta