

ADAMA

Lamdex[®]
5 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA
INSECTICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:
Lambdacyhalothrin..... 50 g/L
Aditivos c.s.p. 1 Litro

Registro PQUA N° 280 - SENASA

Titular del Registro: **ADAMA Agriculture Perú S.A.**

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores, Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60,
Beer Sheva 8410001. Israel.

CONTENIDO NETO: **5 LITROS**

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

NO INFLAMABLE



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

CARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm
Esta etiqueta requiere Hoja Informativa

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación a las vías respiratorias, evitar respirar la aspersión en la mezcla y aplicación.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Tóxico y nocivo por ingestión.
- Este producto causa daño temporal a los ojos.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo químico: Piretroide.**
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y la Hoja Informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- Nota al médico: Se desconoce antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; INFOSALUD: 0800-10-828; CICOTOX : 0800- 13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas y otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos
- No contaminar lagos, ríos, estanques y drenajes con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Lamdex 5 EC es un insecticida no sistémico a base de lambdacihalotrina que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad ovicida y adulticida, y se caracteriza por su poder residual y propiedades repelentes.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
Arroz	Mosca minadora del arroz (<i>Hydrellia wirthi</i>)	0.25	21	1.0
Cebolla	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.125 - 0.15	14	0.2
Espárrago	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.125	7	0.02
Maiz	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	0.15 - 0.20	21	6.0 ¹ /0.05 ²
Papa	Gorgojo de los Andes (<i>Premnotrypes suturalis</i>)	0.25	0	0.01
Vid	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0.15 - 0.20	7	0.2

P.C.: Período de Carenia
LMR : Límite Máximo de Residuos (en partes por millón)
1-forraje /2 - grano.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Número máximo de aplicaciones por campaña: Dos (2). Una (1) campaña al año
Intervalo mínimo entre aplicaciones: 15 días en papa, 10 días en espárrago y 7 días resto de cultivos.

Momento de aplicación:

Ver Hoja Informativa adjunta.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura, con excepción de aquellos que presentan reacción alcalina. Si bien Lamdex 5 EC tiene buena flexibilidad para mezclas en tanque con otros agroquímicos, se recomienda realizar una prueba preliminar de compatibilidad con mezclas no probadas anteriormente.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA