

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA
ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo o aspersión. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado en lugar fresco y seco. En caso de intoxicación llamar al médico o llevar al paciente al centro médico y mostrarle la etiqueta y etiqueta adjunta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.



**Teléfonos de emergencia: CICOTOX: 0800-13040 ó 328-7398 - CIPROSQUIM: 0800-50847 -
ESSALUD: 117**

ZEAMAX 4 SC

HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA – SC

Composición:
Nicosulfuron 40 g/L
Aditivos c.s.p 1 L

Reg. PQUA N°1111– SENASA

Titular del registro: Hortus S.A.

Contenido neto: 500 mL

Lote N°:

Fecha de formulación:

Fecha de vencimiento:

Formulado y envasado por:



Almirante Pastene 300
Teléfono: (56 2) 24706800
Santiago, Chile

Importado y distribuido por:



Calle Sucre 270, Ate. Lima, Perú
Telf.: 717-9040 / 717-9041 Fax: 718-8684
RUC: 20101637221 - RU N° 141097

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ZEAMAX 4 SC es un herbicida sistémico para el control de malezas gramíneas y de hoja ancha, siendo selectivo en tratamiento post emergente en el cultivo del maíz. Su formulación como SC (Suspensión Concentrada) permite una manipulación segura y dosificación mejorada además de incluir un surfactante que mejora la penetración en las malezas. Se aplica dirigido al suelo y se recomienda hacerlo con suficiente humedad en el mismo para facilitar su incorporación.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (L/ ha)	P.C. (Días)	LMR (ppm)
Maíz (<i>Zea mays</i> L.)	Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Pega Pega (<i>Setaria verticillata</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Yuyo hembra o Bledo (<i>Amaranthus hybridus</i>), Tostón o Patagon (<i>Boerhavia erecta</i>), Lechera (<i>Euphorbia hypericifolia</i>) Coquito o chufa (<i>Cyperus rotundus</i>), Grama china (<i>Sorghum halepense</i>)	1,0 - 1,2	45	0,1

P.C: Periodo de Carencia, días desde la última aplicación a cosecha.

LMR: Limite máximo de residuos

Responsabilidad civil: El titular de registro garantiza que las características físico químicas contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

