

# Odeon®

## 720 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA  
**FUNGICIDA AGRÍCOLA**  
 SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:  
 Chlorothalonil ..... 720 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 614 - SENASA

Titular del Registro,  
 Importador y Distribuidor:  
**ADAMA Agriculture Perú S.A.**  
 Av. El Derby N° 254 Of 306.  
 Santiago de Surco. Lima - Perú.  
 Teléfono: (01)641-0000

Formulado por:  
**ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia**  
 Calle 1C N° 7-53 Interior  
 Zona Franca Barranquilla, Colombia.

Contenido neto: **4 Litros**  
 Lote No.  
 Fecha de Formulación:  
 Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO**  
**CUIDADO**

CARA

### LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Cuidado, evite el contacto, posible CARCINOGENO.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar las gotas de aspersión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Utilizar ropa protectora, guantes, botas y máscara durante el manipuleo y aplicación y para re-ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado y etiquetado en un lugar fresco.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Cloronitrilo
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos inmediatamente con chorros de agua manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico.
- En caso de contacto con la piel, quitar las ropas contaminadas, lavar la zona expuesta con jabón suave y enjuagar con agua tibia. Llame a un médico.
- Nota al médico: No existe un antídoto específico. Tratamiento sintomático y terapia complementaria.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)**  
 SAMU: 106; ADAMA AGRICULTURE PERU S.A.: (01)641-0000

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Odeon 720 SC** es un fungicida preventivo con acción de contacto que inhibe la respiración celular en los hongos previniendo el desarrollo de un amplio rango de enfermedades. Realizar la aplicación con gotas finas y cobertura uniforme. Se recomienda utilizar boquillas de cono hueco.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
Cebolla	Mildiu ( <i>Peronospora destructor</i> )	0.35	7	1.5
Espárrago	Mancha de peral ( <i>Stemphyllium vesicarium</i> )	0.6 - 0.8	30	1
Papa	Rancho ( <i>Phytophthora infestans</i> )	0.3 - 0.5	7	0.3

PC.: Período de Carencia      LMR: Límite Máximo de Residuos

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar de forma preventiva cuando las condiciones climáticas favorezcan el desarrollo del hongo o al inicio de la enfermedad. Número máximo de aplicaciones por campaña: 3. Intervalo mínimo entre aplicaciones: 10 días.

#### Momento de aplicación:

Cebolla.- Desde el trasplante hasta antes de la cosecha (hojas dobladas y secas).

#### PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 24 horas de aplicado el producto.

#### COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas de uso común en agricultura, a excepción de aceites y materiales fuertemente alcalinos. Se recomienda realizar un prueba de compatibilidad física.

#### FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podría ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar solo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



CONTRACARA

Dimensiones: 150 mm x 140 mm (por cara)

Nota: Esta etiqueta debe ir acompañada de la Hoja Informativa