

Enlace®

50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA


POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Ingrediente Activo:

Benomyl.....500 g/kg
Aditivos.....c.s.p. 1kg

Registro PQUA N° 027 - SENASA



Titular del Registro:
POINT ANDINA S.A.

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia
II Etapa. La Molina. Lima Perú
Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

Fabricado y formulado por:
POINT AGRO - CHINA LTD.

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China
Teléfono: (86-510) 8785 1001
Fax: 8785 1537



Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

Importado y distribuido por:
SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C.

Av. Guillermo Dansey 2176
Lima Cercado - Perú
Telf: (01) 3368645 / (01) 3368299

Contenido Neto: **0.2 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es irritante a los ojos, piel y aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto por la piel y por inhalación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Benzimidazol
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel y los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental se puede proceder a inducir al vómito.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX: 0800-13040 / CISPROQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 117, 411-8000
POINT ANDINA S.A.: (01) 3481018, (01) 3499609

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua.
- Peligroso para peces; no contaminar lagos, ríos, estanques, fuentes de agua con desechos, restos de la aplicación,

remanentes del producto y envases vacíos.

- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

ENLACE 50 PM es un fungicida sistémico que al ser aplicado sobre el follaje es trasladado por la savia hacia toda la planta, al ser aplicado a las raíces estas lo absorben y lo traslocan a toda la planta. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con mochila mecánica o a motor. Para semillas sumergirlas por 3 a 5 minutos para una mejor impregnación.

FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

ENLACE 50 PM puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo. Puede repetirse la aplicación entre 7 a 14 días. El número máximo de aplicaciones de **ENLACE 50 PM** es de 3 aplicaciones por campaña agrícola. Las aplicaciones foliares y/o en semillas pueden ser preventivas o curativas, cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad o cuando se presentan las condiciones favorables para el desarrollo de dicha enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las 24 primeras horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

ENLACE 50 PM es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común exceptuando los de marcada reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

ENLACE 50 PM no es fitotóxico a los cultivos y dosis indicados en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	NOMBRE DE LA ENFERMEDAD		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Apio	Viruela del apio	<i>Septoria apicola</i>	200	7	3
Cebolla	Podredumbre blanca	<i>Sclerotium cepivorum</i>	200	7	2
Fresa	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	200	0	5
Frijol	Podredumbre blanca	<i>Sclerotinia sp.</i>	500	14	2
Manzano	Sarna del manzano	<i>Venturia inaequalis</i>	200	30	7
Melocoton	Oidio	<i>Oidium sp.</i>	250	14	15
Melon	Oidio	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	200	5	1
Tomate	Viruela del tomate	<i>Septoria lycopersici</i>	200	5	5
Vid	Oidio	<i>Erysiphe necator</i>	200	7	10
Rosas	Oidio	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	200	-	-

DESINFECCIÓN DE SEMILLAS:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	PC	LMR	
Papa	Costra negra	<i>Rhizoctonia solani</i>	100 g/100 L/ TM	14	3

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm). PC: Período de Carencia en días.

*El producto solo se debe aplicar en la etapa de presembrado o en la instalación del cultivo de cebolla.

