

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón, cámbiese y lave la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas.
- Moderadamente tóxico para los peces.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Triazoles
- En caso de ingerir accidentalmente el producto, provocar el vómito y si no administre jarabe de ipecacuana, una cucharada (15 ml) seguida de 1 o 2 vasos de agua. No induzca al vómito ni administre nada oralmente a una persona inconsciente.
- En caso de inhalación, traslade a la persona a un lugar ventilado o un área no contaminada.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con la piel, quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Nota al médico: Este producto no tiene antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y terapia complementaria.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA (líneas gratuitas)
CISPROQUIM: 080-050-847; CICOTOX : 0800- 1-3040; INFOSALUD: 0800-10-828

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- Peligroso para peces.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques, arroyos y drenajes con los restos de aplicación o sobrantes de producto.



ADAMA

Orius®

25 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA (EW)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Tebuconazole.....250 g/L
Aditivos c.s.p.1 Litro

Reg. N° 907-99-AG - SENASA

Titular del Registro: ADAMA Agriculture Perú S.A

Importado y Distribuido por:
ADAMA Agriculture Perú S.A.
Av. Alfredo Benavides N° 1555 Of 404.
Miraflores. Lima - Perú.
Teléfono: 641-0000

Formulado por:
ADAMA Andina B.V.
Sucursal Colombia
Calle 1 C N° 7-53 Int
Zona Franca Barranquilla,
Colombia.

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Lote No.
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Orius 25 EW es un fungicida de amplio espectro de acción formulado a base de tebuconazole que actúa inhibiendo la biosíntesis de esteroides en los hongos. Por su actividad sistémica penetra rápidamente a los tejidos foliares afectando el desarrollo del hongo antes que se presenten los síntomas de la enfermedad y cuando estos ya son visibles.

Orius 25 EW se aplica en pulverización al follaje con equipo de mochila manual o motorizado, o aguilón montado a tractor, debiendo emplearse suficiente cantidad de agua para lograr una buena cobertura del follaje.
Llenar el tanque del equipo de aplicación a la mitad, preparar una premezcla a parte en incorporarla al tanque, luego adicionar agua hasta completar el volumen requerido. Durante la preparación de la mezcla y aplicación mantener en marcha el sistema de agitación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS (ml/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Pyricularia	Pyricularia oryzae	400 - 600	14	-
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	400 - 600	7	-
	Mancha foliar)	Cercospora asparagi	150		
Mandarina	Moho gris	Botrytis cinerea	200	14	-
Mango	Oídiosis	Oidium mangiferae	50	7	-
Marigold	Tizon temprano	Alternaria solani	200	14	-
Tomate	Moho gris	Botrytis cinerea	200	10	-
Vid	Oídiosis	Erysiphe necator	60 - 100	21	0.2

LMR: Límite Máximo de Residuos (en partes por millón) P.C.: Período de Carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones al observar los primeros síntomas de la enfermedad.
En caso de infecciones medianas repetir la aplicación cada 14 días.

PERIODO DE REINGRESO

Se podrá ingresar al campo sin ropa de protección después de 12 horas de aplicado el producto.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de fungicidas, insecticidas y coadyuvantes de uso común a excepción de los materiales fuertemente alcalinos.

FITOTOXICIDAD

No se registraron efectos fitotóxicos cuando se usa a la dosis y volúmenes de aplicación recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Dimensiones: 330 mm x 200 mm