

**“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- La aplicación de **TRICO** debe ser efectuada por operarios agrícolas debidamente protegidos con los elementos de seguridad correspondientes al manejo de extractos vegetales de uso agrícola de Categoría Toxicológica III (overol, guantes, gorra, botas de caucho, caretas y gafas).
- No ingerir.
- No se exponga al contacto, ni respire la neblina a vapores provenientes de la aspersión.
- Este producto puede ser irritante, por lo tanto evite el contacto con la piel, ojos y mucosas. No comer ni beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- **TRICO** no debe ser transportado ni almacenado junto con alimentos, bebidas, medicamentos ni plaguicidas químicos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado en un lugar fresco y aireado, protegido de la incidencia directa de los rayos solares y las altas temperaturas.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto:

- Ingestión: Solamente cuando se está consciente, enjuagar la boca, dar mucho agua a beber (aprox. 500 ml) No provocar el vómito. Siempre consultar al médico.
 - Inhalatorio: No contiene sustancias volátiles.
 - Ocular: Lavar inmediatamente durante tanto tiempo como sea posible con mucho agua. Los párpados deberán mantenerse separados del globo ocular para asegurar el lavado completo. Siempre consultar al médico.
 - Dérmico: Lavar con abundante agua y jabón. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente.
- Antídoto: No tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático.
- NOTA AL MÉDICO:
- En caso de intoxicación: Llame al médico inmediatamente muéstrele una copia de esta etiqueta.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Inutilizar los envases perforándolo.
- Evitar la contaminación de fuentes de agua con el producto o sobrantes del mismo.
- En caso de derrame, controlar la fuente del derrame y usar aserrín o arena para contener el derrame, luego recoger y depositar en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No lave los equipos de aplicación en lagos, ríos, acequias, arroyos o estanques.
- Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.
- No desheche las aguas de lavado, residuos y empaques vacíos en o cerca de fuentes de agua, ríos o lagos.

TRICO
AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO MICROBIANO

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Trichoderma harzianum (Concentración 10^{12} UFC).....0.30 g/L
Aditivos.....C.s.p. 1 Lt.

PBUA N°: 324-SENASA

Titular del Registro:

TERRAGÉNESIS AGROINDUSTRIAL S.A.C.

RUC: 20601659248

Vía la Falca, Sub. Lote 04, Sector Pago de Ñoco

Toma La Huaca Lote 04, Urb. La Falca

GROCIO PRADO CHINCHA - ICA

Teléfono: (01) 597-7815

www.a-tp-pe

Formulado y/o Distribuido por:

TERRAGÉNESIS AGROINDUSTRIAL S.A.C.

RUC: 20601659248

Vía la Falca, Sub. Lote 04, Sector Pago de Ñoco

Toma La Huaca Lote 04, Urb. La Falca

GROCIO PRADO CHINCHA - ICA

Teléfono: (01) 597 78 15

www.a-tp-pe



N° de lote :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :
Cont. Neto : 5 Litros

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- La acción de TRICO es la de un organismo predador, actúa compitiendo por espacio y luego consumiendo a su antagonista.
- Efectivo sobre hongos fitopatógenos de las raíces, hojas y de los vasos conductores.
- Dentro de un plan de manejo orgánico se ha demostrado su eficacia en el control efectivo sobre *Hemileia vastatrix* y *Botrytis cinerea*.
- Este producto no afecta la vinificación.
- No daña la fruta, no produce manchas ni aromas.
- Este producto en particular, fue desarrollado con el objetivo de funcionar como un producto curativo y de efecto inmediato, siendo de esta forma un producto único en el mercado.
- En una medida para pesticidas, medir la cantidad recomendada del producto en un poco cantidad de agua, agitar hasta lograr una mezcla uniforme. Luego echar en el cilindro de aplicación.
- Es preferible usar un coadyuvante siliconado para mejorar la humectación en los tejidos vegetales. Asperjar con buen volumen e agua a fin de lograr una cobertura uniforme.

“Consulte con un Ingeniero Agronomo”

CUADRO DE DOSIS:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (L/Ha)	P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Café	Roya	<i>"Hemileia vastatrix"</i>	1.0	N.A.	N.A.
Vid	Podredumbre gris	<i>"Botrytis cinerea"</i>	2.0	N.A.	N.A.

P.C. = Periodo de Carencia | L.M.R. = Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- La frecuencia y época de aplicación dependerá del nivel de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO

- Reingresar al área aplicada después de las 24 horas transcurridas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD


- Es compatible con insecticidas químicos y fertilizantes foliares.

FITOTOXICIDAD

No presenta fitotoxicidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físicas y biológicas del producto corresponden a los anotados en esta etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usan y maneja de acuerdo con las instrucciones dadas.



PRECAUCIÓN

