

USE CUIDADAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación
- Durante la manipulación, aplicación utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del liquido aspe ado.
- Evitar el contacto con los ojos puede causar irritación.
- Evitar la inhalación y contacto con la piel.
- Después de ta aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacene este producto en casas de habitación.
- Conserve COVERPLUS 230 SC, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar este producto en casa de habitación.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phenilpyrroles

- En caso de ingestión: Dar a beber 1 a 2 tazas de agua e inducir el vómito para reducir al máximo la cantidad de producto ingerida. Realizar sólo si el afectado está consciente, siempre bajo supervisión médica. Trasladar lo antes posible a un centro asistencial, nevando el envase o etiqueta del producto.
 - En caso de inhalación: Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.
 - En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico si existiera irritación
 - En caso de contacto cutáneo: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
 - Síntomas de intoxicación: Náuseas y vómitos después de la ingestión de estos pesticida.
 - Tratamiento: El tratamiento es sintomático y de apoyo.
- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.**

TELEFONOS DE EMERGENCIAS: SAMU: 106; JEMOAGRO: 044-400808

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en la área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COVERPLUS[®] $\frac{230}{SC}$

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fludioxonil 230 g/l
Aditivos (csp) 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1152 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: JEMOAGRO S.A.C
Av. Camino Real N° S/N Panamericana Norte
Km. 557, Sector Alto Moche, Trujillo-Perú
ventas@jemoagro.com

FORMULADO POR: Zhejiang Bosst Cropscience Co., Ltd.

IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR: JEMOAGRO S.A.C.



Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

PROCESO DE USO MANEJO

COVERPLUS 230 se es un moderno fungicida efectivo para el control de diversos hongos entre ellos Botrytis cine rea en tratamientos de post cosecha de frutos.
Se realiza una sola aplicación mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.
Método de preparar la mezcla:
Agite este envase vigorosamente, por lo menos por 3 minutos, antes de usar el producto. Diluir la cantidad indicada de COVERPLUS 230 SC en agua o cera según corresponda, manteniendo agitación continua para obtener una solución homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS
POST COSECHA

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/100 L de agua	L/cil		
Granado	Botrytis	Botrytis cinerea	0.20-0.30	--	0	3
Mandarina	Moho verde	Penicillium digitatum	0.25-0.65	--	0	10
Pimiento	Moho gris	Botrytis cinerea	0.1	--	0	1
Mango	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides	0.10-0.20	--	0	2
Palto	Muerte regresiva	Lasiodiplodia theobromae	0.20	--	0	0.4
Arándano	Moho gris	Botrytis cinerea	0.50-3.0	--	0	2
Vid	Moho gris	Botrytis cinerea	--	0.2-0.3	0	4

Arándano: sistema de aplicación a ultra bajo volumen y caudal controlado

*PC: Periodo de Carencia.

**LMR: Limite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN

Se realiza una sola aplicación a los frutos recién cosechados mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.

PERIODO DE REINGRESO

No hay periodos de reingreso, ya que no hay riesgo específico para el hombre.

COMPATIBILIDAD

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes OJ(dantes. Antes de efectuar las mezclas se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

FITOTOXICIDAD: No aplica, ya que se va a aplicaren productos de post cosecha.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

