

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

- Precauciones y advertencias de uso y aplicación**
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
 - Durante la manipulación, aplicación utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta.
 - No aplicar con viento y no trabajar en la neblina o líquido asperjado.
 - Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación.
 - Evitar la inhalación y contacto con la piel.
 - Después de la aplicación lavarse con abundante agua fría y jabón.
 - No aplicar en áreas cercanas a cultivos de frutas y verduras, reguladores de crecimiento o semillas.
 - No almacenar este producto en casa de habitación.
 - Conserve COVERPLUS 230 SC, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
 - No almacenar este producto en casa de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Pirimorfinos
- En caso de ingestión: Dar a beber 1 a 2 vasos de agua e inducir el vómito para reducir al máximo la cantidad de producto ingerido. Realizar solo si el afectado está consciente, siempre bajo supervisión médica. Trasladar al más pronto a un centro asistencial. Evitar el empuje o el agitado del producto.
- En caso de contacto con los ojos: Lavarlos inmediatamente con abundante agua fría. Enjuagar los ojos por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel: Lavarlos inmediatamente con abundante agua fría. Enjuagar la piel por lo menos 15 minutos.
- En caso de contacto con la ropa: Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Síntomas de intoxicación: Náuseas y vómito pueden ocurrir después de la ingestión de estos pesticidas.
- Tratamiento: El tratamiento es SINTOMÁTICO Y DE APOYO

- EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar al: CICOTOK: 326-7356, CETOK: 213-2316, ESSALUD en líneas 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación. Luego multiruido, triturando o perforando y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el ingreso al medio del presente envase.
Derivado el envase según lavado al centro del acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- No arrojar el envase vacío a los ríos, lagos, mares, ni a los desechos, a envases vacíos.
- No contaminar los recursos de agua con los restos de aplicación o sobranes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas félicas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.



COVERPLUS® 230 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fludioxonil 230 g / L
Aditivos (csp) 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1152 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: JEMOAGRO S.A.C.

FORMULADO POR: Zhejiang Boost Coscience Chemical Co., Ltd.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: JEMOAGRO S.A.C.

Nº de Lote:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Formulación:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COVERPLUS 230 SC es un moderno fungicida efectivo para el control de diversos hongos entre ellos *Botrytis cinerea* en tratamientos de post cosecha de frutos.
Se realiza una sola aplicación mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.

Método de preparar la mezcla:

Agite este envase vigorosamente, por lo menos por 3 minutos, antes de usar el producto. Diluir la cantidad indicada de COVERPLUS 230 SC en agua o cera según correspondía, manteniendo agitación continua para obtener una solución homogénea.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (gram)
	N. Común	N. Científico	L./100 L de agua	Litro		
Granado	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2-0.3	-	0	3
Mandarina	Moho verde	<i>Peridermium digitatum</i>	0.25	-	0	10
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1	-	7	1

*PC: Período de Censura

** LMR: Límite Máximo de Residuos

Frecuencia y Época de Aplicación:

Se realiza una sola aplicación a los frutos recién cosechados mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.

Reingreso al área tratada:

No hay períodos de reingreso, ya que no hay riesgo específico para el hombre.

Incompatibilidad: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes. Antes de efectuar las mezclas se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

Fito toxicidad: No aplica, ya que se va a aplicar en productos de post cosecha.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

