

“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Precauciones y advertencias de uso y Aplicación

- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Durante la manipulación, aplicación utilizar ropa protectora y equipo de protección personal indicado en la etiqueta.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- Evitar el contacto con los ojos puede causar irritación.
- Evitar la inhalación y contacto con la piel.
- Después de la aplicación bañese con abundante agua fría y jabón.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No almacene este producto en casas de habitación.
- Conserve **COVERPLUS 230 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar este producto en casa de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo Químico:** Phenilpyrroles
- **En caso de ingestión:** Dar a beber 1 a 2 tazas de agua e inducir el vómito para reducir al máximo la cantidad de producto ingerida. Realizar sólo si el afectado está consciente, siempre bajo supervisión médica. Trasladar lo antes posible a un centro asistencial, llevando el envase o etiqueta del producto.
- **En caso de inhalación:** Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.
- **En caso de contacto con los ojos:** Lavarlos inmediatamente con abundante agua limpia, manteniendo los párpados bien abiertos. Acudir al médico si existiera irritación.
- **En caso de contacto cutáneo:** Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavarse con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- **Síntomas de intoxicación:** Náuseas y vómito pueden ocurrir después de la ingestión de estos pesticidas.
- **Tratamiento:** El tratamiento es SINTOMÁTICO y DE APOYO
- **EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.**

EMERGENCIAS: Llamara: CICOTOX: 328-7398. CETOX: 213-2318. ESSALUD en línea: 411-8000 opción 4.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase .
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos ó envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No aplicar el producto en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

COVERPLUS® 230 SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRARADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Fludioxonil 230 g / L
Aditivos.....(csp) 1 L

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 1152 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: JEMOAGRO S.A.C.

FORMULADO POR: Zhejiang Bosst Cropscience
Chemical Co., Ltd.

IMPORTADO Y
DISTRIBUIDO POR: JEMOAGRO S.A.C.

Nº de Lote:
Fecha de Vencimiento:
Fecha de Formulación:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

COVERPLUS 230 SC es un moderno fungicida efectivo para el control de diversos hongos entre ellos *Botrytis cinerea* en tratamientos de post cosecha de frutos.
Se realiza una sola aplicación mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.

Método de preparar la mezcla:

Agite este envase vigorosamente, por lo menos por 3 minutos, antes de usar el producto. Diluir la cantidad indicada de COVERPLUS 230 SC en agua o cera según corresponda, manteniendo agitación continua para obtener una solución homogénea.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L / 100 L de agua	L/ha		
Granado	Botritis	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2-0.3	--	0	3
Mandarina	Moho verde	<i>Penicillium digitatum</i>	0.25	--	0	10
Pimiento	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1	--	7	1
Mango	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloeosporoides</i>	0.1-0.2	--	0	2
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.2	--	0	0.4

*PC: Periodo de Carencia

** LMR: Límite Máximo de Residuos

Frecuencia y Epoca de Aplicación:

Se realiza una sola aplicación a los frutos recién cosechados mediante tratamiento por inmersión, en sistema de drench o ducha de tal forma que asegure obtener una adecuada cobertura de la fruta.

Reingreso al área tratada:

No hay periodos de reingreso, ya que no hay riesgo específico para el hombre.

Incompatibilidad: Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con los ácidos fuertes, productos alcalinos y agentes oxidantes. Antes de efectuar las mezclas se recomienda hacer pruebas de compatibilidad con el plaguicida que se desea aplicar.

Fitotoxicidad: No aplica, ya que se va a aplicar en productos de post cosecha.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

