

AMARELO⁴⁰⁰ EC[®]

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

HERBICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

Composición:

Pendimethalin 400g/L
Aditivos csp 1L

Registro PQUA N° 1155 - SENASA

Titular de Registro, Importador y Distribuidor:

FARMAGRO S.A.
Av. Principal 2, Ma. CS (Calle 28, 4 y 5)
D.L. Huachipa Calle, San Antonio - Huachipa, Lima,
Central, (01) 614 1500**FARMAGRO** 
MEJORES PRODUCTOS PARA MEJORES COSECHAS

FORMULADOR:

JIANGSU YUAG CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
N° 309, Changlinghe, Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing, China

Contenido Neto: 600 ml

Lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Este producto es dañino, no ingerir, ni respirar el polvo o la nebulización.
- Evitar el contacto con ojos, piel y ropa.
- Utilice el equipo de protección durante la mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar bajo llave, fresco, seco y ventilado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forraje.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas, ni alimentos.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Dinitroanilina.
- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provocarse el vómito.
- En contacto con los ojos lávelos inmediatamente con agua abundante durante 20 minutos.
- En contacto con la piel, quite la ropa y lávela con abundante agua y jabón.
- Inhalación: retire al paciente a un lugar fresco y proporcione respiración artificial si fuera necesario.
- Antídoto: No hay antídoto específico, administrar carbón activo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

SAMU: 106 - FARMAGRO: 614 1500

DISPROQUI: 080 050 547



"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		LHR (g/ha)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	Período de Control (días)	
CEREA	Papa de galina	Gnathypus	2.5	30	0.05
	Papa de galina	Gnathypus			
CAÑA DE AZÚCAR	Amor seco	Solenopsis	2.5**	30	0.05
	Verdugo	Amor seco			
ALCACHOFA	Amor seco	Solenopsis	2.5**	300	0.1
	Verdugo	Amor seco			

LHR: Lítros por Hectárea de Plagas. ** Gasto de agua: 300 l/ha. * Gasto de agua max: 600 l/ha.

